液化型 α -淀粉酶的精制及其性质的研究

张 星 元

摘 要

从能液化淀粉酶枯草杆菌 *Bacillus amyloliquefaciens* K 49 的发酵液出发, 通过硫酸铵盐析、淀粉吸附、DEAE-葡聚糖凝胶的离交浓缩和交联葡聚糖凝胶过滤等步骤, 获得了电泳纯的液化型 α -淀粉酶制剂。以这种酶制剂为材料, 采用分子筛(交联葡聚糖凝胶 G-100)估得该酶的分子量为 47,000。通过等电聚焦测得该酶的等电点为 pH 5.24。酶学性质的研究结果表明, 该酶确系液化型 α -淀粉酶, 其作用最适 pH 为 5.8, 最适温度为 70°C, 在 pH 7-10 的范围内比较稳定(40°C, 20 小时), 但对热不够稳定。Ca⁺⁺ 离子的存在能提高酶的热稳定性, 氯化钠能使酶激活。

前 言

α -淀粉酶(EC 3.2.1.1. α -1,4-glucan 4-glucanohydrolase) 是任意水解淀粉分子中 α -1,4-葡萄糖苷键的酶, 在纺织工业和食品工业上有广泛的用途。

枯草芽孢杆菌产生的 α -淀粉酶因菌种不同大致可分为两种类型。一种是液化型 α -淀粉酶(Bacterial Liquefying Amylase 简称 BLA), 另一种是糖化型 α -淀粉酶(Bacterial Saccharifying amylase 简称 BSA)。

本研究以枯草芽孢杆菌 K49 的培养液为材料, 对其液化型 α -淀粉酶进行纯化, 并用纯化的酶研究该酶的性质, 并对该酶的有关性质进行讨论。本研究所建立的研究方法可在研究属于枯草芽孢杆菌的其它菌种生产的液化型 α -淀粉酶时作参考。

材 料 和 方 法

一、菌种 *Bacillus amyloliquefaciens* K49⁽²⁾

二、培养基及培养条件

大豆粕 5% (在 0.5% NaOH 中煮沸抽提一小时, 过滤, 用滤液), 可溶性淀粉 3%, 玉米浆 1%, (NH₄)₂HPO₄ 1%, 消前 pH 7.0, 500ml 坂口瓶装液 80ml, 接种后在 120rpm 往复式摇床 30°C 培养 24hr 后接入 20 l 的 Waldhof 型发酵罐(培养基同上, 装液 10 l), 搅拌转速 180rpm,

通气量1 vvm, 35℃培养三天。

三、 α -淀粉酶的分析方法

1%可溶性淀粉溶液5ml, 样品酶液1ml 在0.1M pH6.0 醋酸盐缓冲条件下于40℃水浴作用15min (精确计时) 后, 按改良的 Fehling-Lehmann Schoorl 法⁽³⁾测定酶反应混合物中的还原糖含量。在上述条件下, 使反应混合物释放 1 毫克分子葡萄糖的酶的量被定义为一个酶单位。酶活力与酶液的蛋白质浓度(280nm 波长下的 OD 读数)之比即为比活力。

四、DEAE-葡聚糖凝胶柱析层⁽⁴⁾

将样品加入预先经0.01M 醋酸盐缓冲液(pH 5.8, 含0.01M Ca-AC₂) 平衡了的 DEAE-葡聚糖凝胶柱(30×300mm), 然后用适量的 NaCl 含量从 0 到 0.5M 的同样的醋酸盐缓冲液洗脱。收集洗脱液(每管15ml), 并顺次分别测定每管的 OD₂₈₀ 和酶活力。

五、交联葡聚糖凝胶过滤

根据 Andrews⁽⁵⁾的方法在交联葡聚糖凝胶 Sephadex G-100 柱(30×1330mm) 上进行。平衡和洗脱时用含有 0.01M Ca-AC₂ 和 0.1M NaCl 的 0.01M 醋酸盐缓冲液(pH 5.8), 洗脱速度为 22ml/hr。收集洗脱液(每管6.6ml), 顺次分别测定每管的 OD₂₈₀ 和 OD 峰处的酶活力。

六、聚丙烯酰胺凝胶电泳

根据 Darvis⁽⁶⁾的方法。丙烯酰胺浓度 7.5%, 柱规格 5×70mm, 缓冲系统 pH 8.3, 电流 2-5mA/柱, 在室温下电泳 40min, 以 1% 酰胺黑 10B(溶于 7% 醋酸中)液染色 1 hr 后在 7% 醋酸溶液中通电(5mA/柱) 4hr 脱色。

七、等电聚焦方法⁽⁷⁾

用 LKB 8101 等电聚焦柱(110ml) 测定酶的等电点。由载体两性电解质(Ampholyte pH 3.5-10)和蔗糖溶液按规定比例配制混合溶液 24 管(其中第 13 管含有被检酶液 2.0ml), 将它们顺次装入柱中。在 350v, 4℃ 条件下通电聚焦 42hr, 按每管 2ml 收集柱中液体, 并顺次分别测定酶活力 pH 及 OD₂₈₀。

八、变旋光效应的检测⁽⁸⁾

往 6ml 5% 淀粉溶液中加入 0.5ml 酶溶液(约 20u/ml), 在 25℃ 进行酶水解反应, 于不同的时间间隔测旋光度。反应 60min 时, 加入 3mg Na₂CO₃, 过 10min 后再测旋光度, 比较加 Na₂CO₃ 前后的旋光变化。

九、纸上层析

将淀粉的酶水解液点在东洋 50 号滤纸上, 用正丁醇、吡啶和水(6:4:3, 体积比)的溶剂系统在 50℃ 下一次上行展开(上行距离 30cm 以上), 用碱性硝酸银检测法显色⁽⁹⁾。

十、液化淀粉酶活性的快速检测法

取 0.1ml 酶液加入 5ml 以 0.05M 醋酸盐缓冲液配制的 1% 淀粉溶液, 置 40℃ 水浴反应在不

同的时间取出，加入 0.1N I₂-KI 溶液 (0.1N KI, 0.002N I₂) 显色，与标准的 0.1N I₂-KI 溶液的颜色作比较，计达到标准色度的反应时间，以反应时间长短度量酶活力的大小 (时间越长酶活越低)。

十一、试剂

DEAE-葡聚糖凝胶 A-50，交联葡聚糖凝胶 G-100 为瑞典产品，Visking 透析膜为美国产品，酶作用的各种底物有些是日本有关公司或实验室提供的，其余为日本商品。

结果和讨论

一、α-淀粉酶的提纯

K49 是典型的液化型 α-淀粉酶产生菌。该菌在 Waldhof 型发酵罐中培养 65hr 酶活达 437u/ml。以此发酵液为材料，提纯 α-淀粉酶。提纯的方法和结果见图 1。

图 1 K49 液化型 α-淀粉酶的纯化过程

将发酵液冷冻离心，其清液作为出发酶液，其 α-淀粉酶活力为 411u/ml。

1. 盐析和吸附：用 24% 的硫酸铵饱和度，将出发酶液在 5°C 冷室静置过夜，经冷冻离心除去沉淀 (杂蛋白质) 令其清液通过装有玉米淀粉吸附层的布氏漏斗。该吸附层由 10 份玉米淀

粉和1份助滤土(Super Cel)和24%饱和度的硫酸铵溶液拌和而成。每升酶液约用10g玉米淀粉。用材料与与方法部分中所述酶活性快速检测法检查流出液的酶含量及控制吸附操作。用0.033M Na₂HPO₄溶液在40℃下将吸附在玉米淀粉上的酶洗脱下来,洗脱20min后抽滤得含α-淀粉酶的澄清的洗脱液。对在吸附过程中流过吸附层的溶液中残存的酶,进一步用70%的硫酸铵饱和度在冰浴中盐析(2hr以上),将其沉淀溶于适量的0.02M Tris-马来酸缓冲液(pH7.5)。将这含酶的缓冲液和上述含酶的洗脱液分别在0.01M的同种缓冲液(pH7.5)于5℃下透析48hr。透析液中含α-淀粉酶 4.21×10^5 单位,占出发酶总酶量的21.8%。

2. 离交浓缩:通过DEAE-葡聚糖凝胶A-50柱对透析所得酶液进行离交浓缩。浓缩结果是酶主要集中在第31—44号14个试管210ml洗脱液中,其中第39和40号管活力最高,均在1900u/ml以上。从21号到55号共35个试管中的酶的总量为 4.07×10^5 单位,占出发酶液中酶总量的21.1%,离交收率96.8%。

3. 交联葡聚糖凝胶柱层析分离酶蛋白:取上述第39号和40号管混合而得浓缩酶液各2ml,在同一根交联葡聚糖凝胶G-100柱先后进行层析。第一次操作所用的缓冲液含0.1M NaCl,第二次不含NaCl。洗脱曲线见图2。从图上可见,不论有没有NaCl存在,OD和酶活力高峰出现的时刻变化不大。但在有NaCl存在时,酶活力的高峰比无NaCl时更高些。洗脱曲线上其余的OD峰不显α-淀粉酶活性,为层析分离出来的杂蛋白峰。

图2 K49液化淀粉酶在交联葡聚糖凝胶G-100柱上的洗脱曲线
A. 缓冲液中含NaCl B. 缓冲液中不含NaCl

在第一次操作中,以第78号到91号管中所含的酶活力计,收率为104.9%;在第二次操作中,以第76号到95号管中所含酶活力计,收率为89.1%。由此推测NaCl对α-淀粉酶有激活作用。

交联葡聚糖凝胶层析使酶进一步纯化,酶液的比活力从离交浓缩后的178u/OD上升到468u/OD。此时所得纯化酶制剂的活力为132u/ml,供以下试验用。

二、酶的纯度的鉴定

聚丙烯酰胺凝胶电泳：对纯化的酶制剂进行聚丙烯酰胺凝胶电泳其结果是只见到一条色带(图3)，可见此酶已被纯化。

三、分子量的估计⁽¹⁰⁾

交联葡聚糖凝胶过滤：以兰葡聚糖(Blue dextran)为大分子参照物，以牛血清蛋白(Bovine serum albumin)、卵清蛋白(Ovalbumin)、糜蛋白酶原(Chymotrypsinogen)、核糖核酸酶(Ribonuclease)为标定蛋白，利用交联葡聚糖凝胶 G-100 柱(16×950mm)为分子筛，进行凝胶过滤，估得该 α -淀粉酶的分子量为47,000(图4)。

四、等电点的测定

用已纯化的酶制剂按材料与方法部分所述等电聚焦法测得 K49 液化淀粉酶的等电点为 pH 5.24(图5)。

五、变旋光现象

α -淀粉酶作用于淀粉溶液生成 α -葡萄糖。 α -葡萄糖在溶液中逐步地转变成 β -葡萄糖，最后达到实验条件下的 α -型和 β -型葡萄糖的平衡。在溶液中加入碱，可以加速这种平衡的建立。由于 α -葡萄糖的旋光度比 β -葡萄糖的高，碱的加入使反应混合物中过量的 α -葡萄糖迅速转变成 β -葡萄糖，表现为旋光度下降。

图3 K49液化淀粉酶的聚丙烯酰胺凝胶电泳结果

图4 K49液化淀粉酶分子量的估计(交联葡聚糖凝胶过滤法)

图中：a为核糖核酸酶(分子量为14,000)；b为糜蛋白酶原(分子量为25,000)；c为卵清蛋白(分子量为45,000)；d为牛血清蛋白(分子量为67,000)。

图 5 K49 液化淀粉酶等电点的测定(等电聚焦法)

图 6 K49 液化淀粉酶的变旋光试验

采用材料和方法部分中检测变旋光效应的方法检查 K49 的酶。加碱后旋光度确实下降(图 6), 表现了 α -淀粉酶的特性。

六、酶的热稳定性

1. 对 pH 的稳定性。如图(7)所示, 当 pH 值低于 5 时稳定性差(于 40°C 温度下存放 20hr 后酶活几乎全部消失), 但在 pH 5—10 范围内, 即使在 40°C 环境下也比较稳定。

2. 对热的稳定性: 如图 8 所示, 这种 α -淀粉酶对热并不稳定。在实验条件下, 当处理温度上升时酶活力就下降; 但当有 Ca^{++} 存在时, 酶的热稳定性就增强。说明 Ca^{++} 对该酶的活性有保护作用。

图 7 K49 液化型淀粉酶对 pH 的稳定性

处理条件: 酶浓度 30u/ml, 缓冲液浓度 0.05M, 处理温度 40°C, 处理时间 20hr, 在不同 pH 下处理后, 测残存酶活力

图 8 K49 液化型 α -淀粉酶对温度的稳定性

处理条件: 酶浓度 30u/ml, Ca^{++} 浓度 0.1M 或 0, 缓冲液 0.05M, pH 6.0, 处理时间 15 分钟在不同温度下处理后测残存酶活力

七、酶作用的最适温度和最适 pH

如图 9 所示, K49 液化型 α -淀粉酶的最适作用温度是 70°C , 当作用温度高于 90°C 酶活力迅速丧失; 该酶的最适作用 pH 是 6 (图 10), 当 pH 高于 8 和低于 4 时, 酶就不能充分发挥作用。

图 9 温度对 K49 液化型 α -淀粉酶活性的影响

酶作用的条件: 底物浓度, 1% 可溶性淀粉溶液; 缓冲液, 0.05M 醋酸盐缓冲液, pH 6.0; 酶浓度 1u/ml, 在不同温度下作用 15 分钟。

图 10 pH 对 K49 液化型 α -淀粉酶的活性的影响

酶作用条件: 底物浓度 1% 可溶性淀粉酶浓度 1u/ml; 缓冲液浓度 0.05M; 作用温度 40°C 。在不同 pH 下作用 15 分钟。

八、对各种基质的作用

如表一所示, 在实验条件下, K49 液化型 α -淀粉酶制剂作用于可溶性淀粉、直链淀粉、支链淀粉和 β -界限糊精而产生葡萄糖, 但几乎不能分解葡聚糖 10、 α -环状糊精、 β -环状糊

表一 K49 液化型 α -淀粉酶对各种基质的作用*

编号	基质名称	还原糖(葡萄糖mg)	相对速率(%)
1	可溶性淀粉	2.18	100
2	直链淀粉 $\overline{\text{DP}}_n 100$	2.73	125
3	支链淀粉 G	2.76	126
4	动物淀粉	1.81	83
5	β -界限糊精	1.33	61
6	葡聚糖 10 (MW 10,000)	—	—
7	α -环状糊精	—	—
8	β -环状糊精	—	—
9	普鲁兰 $\overline{M}_n 30 \times 10^4$	—	—
10	爱希南	—	—

* 反应体系基质浓度 2mg/ml, 酶浓度 0.25u/ml, pH 6.0 醋酸盐缓冲液的浓度 0.002M, CaCl_2 浓度 0.002M, NaCl 浓度 0.01M, 作用温度 40°C , 作用时间 24hr。

精、普鲁兰(Pullulan)和爱希南(Elsinan)。

九、酶对可溶性淀粉的水解

图 11 液化型 α -淀粉酶对可溶性淀粉的作用(I) 用糖化酶处理滤纸后显色
图中MO是麦芽寡糖

图 12 液化型 α -淀粉酶对可溶性淀粉酶的作用(II) 未用糖化酶处理即显色
图中MO是麦芽寡糖

综合K49液化型 α -淀粉酶对各种底物作用的结果,可以认为这种酶在适当的条件下能以很快的速度任意切割线状或树枝状的葡聚糖(包括淀粉)大分子中的 α -1,4-葡萄糖苷键,但作用速度随着大分子中以 α -1,4-葡萄糖苷键相连的部分的葡萄糖单位数的减少而降低。这种酶不能(或很难)切割环状葡聚糖分子中的 α -1,4-葡萄糖苷键。

致谢: 本文撰写过程中,得到无锡轻工业学院发酵教研室主任檀耀辉副教授指导,特致谢意。

在20ml 2%可溶性淀粉溶液和18ml 0.02M 磷酸盐缓冲液(pH6.0)中加入 2ml 酶液(5u/ml 或1u/ml), 于40℃水浴中作用, 在规定的时刻取出在沸水浴中处理 15min后做纸层析、测总糖、还原糖(葡萄糖)和与碘的呈色度(取 0.5ml 样品, 用蒸馏水稀释到 16ml, 以 4 ml 0.01N I_2 -KI 溶液发色, 测 660nm 波长下的光密度)。如图 11 和 12 所示酶作用于可溶性淀粉, 产生葡萄糖(G_1), 麦芽糖(G_2), 麦芽三糖(G_3)... 和低分子糊精。作用于淀粉分子能在很短的时间内把它切割成对碘不呈色的低分子糊精(图13), 但作用终点时水解液的还原糖含量仍不高。由此可见要想单独使用液化型 α -淀粉酶来获得还原糖是有一定困难的。

图 13 K49 液化型 α -淀粉酶对淀粉作用的研究结果

图中三角形的点指的是酶浓度为 5u/ml 时的情况, 圆点指的是酶浓度为 1u/ml 时的情况。空心点代表光密度, 实心点代表分解率。

参 考 文 献

- [1] J.Fukumoto, T.Yamamoto and K. Ichikawa, Proc. Japan Acad., **27**, 352 (1951).
- [2] J. Fukumoto and S. Okada, J. Fermentation Technol., **41**, 427(1963).
- [3] 福井作茂: 生物化学实验法, 还原糖の定量法, 东京大学出版会(1969)。
- [4] 竹西繁行: 科学と工业, **52**(4),139(1978)。
- [5] P.Andrews, Biochem.J., **96**, 595(1965)。
- [6] B.J.Davis, Ann. N.Y.Acad. Sci., **121**, 404(1969)。
- [7] The Instruction Sheet of LKB 8101 Electrofocusing Column.
- [8] 不破英次、二国二郎: 农芸化学会志, **26**, 154(1952)。
- [9] W.E. Trevelyan, D.P.Procter and J.S.Harison, Nature, **166**,444(1950)。
- [10] 林胜哉: 蛋白质的分子量·分子形, 东京大学出版社(1971)。

Purification and Some Properties of Bacterial Liquefying α -Amylase

Zhang Xing-yuan

Abstract

Liquefying α -Amylase from a bacterium, *Bacillus amyloliquefaciens* K49, was purified to an electrophoretically homogeneous state by precipitation with ammonium sulfate, adsorption with starch, column chromatography with DEAE-Sephadex and gel filtration with Sephadex G-100. Its molecular weight was estimated to be about 47,000 by gel filtration (Sephadex G-100), and its isoelectric point was at pH 5.24. The enzyme was most active at pH 5.8 and at 70°C, and was stable between pH 7 and 10 (40°C, 20 hr), but not stable over 70°C (15min) in the absence of Ca⁺⁺ ion.