核磁共振氢谱在“棉酚制品”一组分 结构研究中的应用

韶东 陶冠军 祝耀初

(无锡轻工大学中央研究设计所, 无锡, 214036)

摘要 为了确定“棉酚制品”中一组分的分子结构,用化学法证明该组分是一种有机氮化合物。用核磁共振氢谱($^1\text{H NMR}$)研究该组分时,以纯棉酚作模型化合物,在实验指认该模型化合物 $^1\text{H NMR}$ 谱线的基础上,解析了上述组分的 $^1\text{H NMR}$ 谱,并推出它可能的分子结构,最后用标样双苯胺棉酚得到证实。

关键词 核磁共振氢谱($^1\text{H NMR}$);棉酚;双苯胺棉酚

中图分类号 O641.13

0 前 言

从一份抗氧化性能良好的“棉酚制品”中分离精制得一黄色粉末组分(简称 B)。为了确定该组分是否就是棉酚还是别的化合物,做了必要的化学法鉴定试验,而后用核磁共振氢谱($^1\text{H NMR}$)法鉴定,实验设计中用纯棉酚作模型化合物,做 B 与棉酚同样实验条件下的 $^1\text{H NMR}$,试图从比较图谱来确认。

对于棉酚的 $^1\text{H NMR}$ 文献^[1,2]虽有报道,但在一些信号的归属上还不够明确,有些基团偶合的 J 值还欠缺。作者对棉酚的 $^1\text{H NMR}$ 作了必要的讨论,确立了信号和结构间的关系,目的旨在为 B 的结构确证提供可循的依据。

1 实 验

用 WL-型显微熔点测定仪(厦门教学仪器厂)测熔点, $^1\text{H NMR}$ 谱由日本 JEOL FX-90Q 核磁共振仪获得,样品溶于 CDCl_3 , TMS 作内标, D_2O 做氢交换,共振频率 89.55 MHz,谱宽 1.80 KHz,脉冲宽 11 μs ,脉冲延迟 5s。化学实验操作见文献 [3, 4],所用试剂均为二级。

2 结果和讨论

2.1 棉酚的 $^1\text{H NMR}$

棉酚的分子结构见图 1,它的 $^1\text{H NMR}$ 数据见表 1,由于分子对称,下面只讨论一个萘环

上的¹H位移,其中W在15.17(1H, S)出现的信号(D₂O交换可消失)归属于C_{7,7}-OH,因为它与邻位的羰基形成分子内氢键,共振在低场

图1 棉酚的分子结构

偏向低场^[5]。环上的C_{3,3}-CH₃, W₂ 15(3H, S)。环上的异丙基裂分符合n+1规律(A₆X体系)^[6],两个等价的CH信号重叠,CH和CH偶合出双峰,W₁ 54(6H, d, J=7.0Hz),CH裂分成多重峰,W₃ 85(1H, m, J=7.0Hz),结合积分比(2CH:CH=6:1)不难识别这两个基团。W₅ 78(1H, S)和W

6.42(1H, S)两个信号,D₂O交换都可消失,系C_{1,1}-OH和C_{6,6}-OH。文献[1]对哪个OH对应哪个W没有明确指认。作者认为,C_{1,1}-OH处在另一苯环邻位^[7],它又比C_{6,6}-OH距醛基近,醛基要吸电子,所以C_{1,1}-OH上质子的电子云密度比C_{6,6}-OH的要低,屏蔽弱,于是可以判定W_{6.42}的信号是C_{1,1}-OH,而W_{5.78}的信号为C_{6,6}-OH。

2.2 B的结构确证

2.2.1 化学法试验 结果列于表2

表2中2,4-二硝基苯肼试剂呈酸性,成SHIFF碱形式的亚胺类化合物在此介质中会水解成醛和胺,结果呈正反应。棉酚是不

含氮的化合物,所以B不可能是棉酚,很可能是一种SHIFF碱形式的亚胺类化合物。

2.2.2 B的¹H NMR鉴定 B的¹H NMR数据见表3,比较表1和表2数据可以发现,B的部分共振信号与棉酚不同,但W₁ 54, W₂ 16, W₃ 85, W₅ 80和W₇ 62这些信号与棉酚中某些信号类似,积分质子数与棉酚的某些信号也相同。这些结果说明:1) B的分子不是棉酚分子;2) B的分子在骨架及有关基团上与棉酚分子有某些一致,其中W₇ 62(1H, S)这个信号很值得注意,它同棉酚的W₇ 78信号实际是属同一位置的氢,积分也为1H,说明B分子像棉酚分子那样具萘环并也在同一位没接上取代基,B在W₇ 28的一个大峰像是苯的信号(溶剂氯仿在W₇ 22),所以推测B很可能是棉酚与一个含苯环的化合物化合而成的,且此苯环为单取代,因其积分与甲基和单个质子基本成比例(5H, S)。

因B的化学位移数据中在W_{15.17}和W_{11.13}处均未见信号,而出了W_{14.75}(1H, S)和W_{10.15}(1H, S)两个峰,这是含苯环化合物和棉酚起反应(主要是与棉酚分子中的醛基起反应)生成新化合物引起的。这会是苯的什么化合物呢?从化学法试验中得知,B是一种有机氮

它与邻位的羰基形成分子内氢键,共振在低场。W_{11.13}(1H, S)的信号为醛质子信号,主要因羰基及芳环的磁各向异性造成了它强烈的去屏蔽,使得其W低至11.13。W_{7.78}(1H, S)归属于C_{4,4}-H,它是棉酚萘环唯一未被取代的体现,它的W比简单苯质子大,这一方面是具有萘环的缘故,另外,醛基是吸电子基,也有可能通过环使C_{4,4}-H质子的电子云密度降低,减弱屏蔽,使它的质子W

表1 棉酚的¹H NMR数据

¹ H NMR(W, CDCl ₃ , TMS)	¹ H NMR(W, CDCl ₃ , TMS)
15.17(1H, S, C _{7,7} -OH)	5.78(1H, S, C _{6,6} -OH)
11.13(1H, S, -CHO)	3.85(1H, m, J _{CH-CH₃} = 7.0Hz, C _{5,5} -(Me) ₂ CH)
7.78(1H, S, C _{4,4} -H)	2.15(3H, S, C _{3,3} -CH ₃)
6.42(1H, S, C _{1,1} -OH)	1.54(6H, d, J _{CH₃-CH} = 7.0Hz, C _{5,5} -(CH ₃) ₂ C)

表2 化学法检验 B

实验项目	结果
熔点	> 250°C
灼烧	烧尽,放出碱性臭气,示有机胺
消化液氮检验	放出碱性臭气,示有氮
0.01% KMnO ₄	迅速褪色,示具二元酚羟基
2,4-二硝基苯肼	棕红色沉淀,示有醛或胺

化合物,所以猜想这可能是一种苯胺化合物。因为苯胺能与棉酚醛基起反应生成一种 SHIFF 碱形式的新化合物双苯胺棉酚^[8](以下简称 DAGP)。假定上面的讨论成立,再观察 DAGP 的分子结构(图 2),发现 C_{7,7'}-OH 和 N 之间也能形成分子内氢键,如 O-H...N,但它比氢键 O-H...O 弱。这样在 DAGP 中 C_{7,7'}-OH 质子上电子云的屏蔽作用反比棉酚的 C_{7,7'}-OH 强,于是其 W 就可以向高场移到 14.75,这个信号扁而宽(积分却十分明显),这正是弱氢键和具电四极矩的 N 核对 C_{7,7'}-OH 直接影响的证明^[9,10]。

DAGP 中的 C_{9,9'}-H,不像在棉酚中那样受羰基磁各向异性的影响和受氧原子吸电子的影响,所以它的电荷密度要比棉酚的 C_{9,9'}-H 高,屏蔽强,其 W_{10.15},比棉酚的 11.13 向高场位移了 0.98 是有可能的。另外,实验发现此峰形不尖,这是由于和 C_{1,1'}-OH 的质子之间存在跨越空间偶合的缘故^[5],通过加重水作验证,由于此时 OH 不复存在,C_{9,9'}-H 即呈尖锐的单峰出现。

DAGP 分子不像棉酚分子有吸电子醛基,加上苯胺基的引入,使得环上电子云密度比棉酚高,这样同是 C_{4,4'}-H,在 DAGP 中,质子的电子云屏蔽就比棉酚中的高,所以 DAGP 中 C_{4,4'}-H 的化学位移要向高场位移抵 7.62,比棉酚同位质子 7.78 向高场位移 0.16。

关于棉酚改性成 DAGP 后 C_{1,1'}-OH 和 C_{6,6'}-OH 的归属 C_{1,1'}-OH 处在另一苯环邻位^[7],距引入的苯胺基团比 C_{6,6'}-OH 近,原先棉酚的 C_{1,1'}-OH 周围空间比较松散,改性成 DAGP 后,松散的空间变得拥挤而产生位阻,结果使 C_{1,1'}-OH 质子上的电子受邻近基团(主要是 C_{9,9'}-H)的排斥,净的效应是降低 C_{1,1'}-OH 的逆磁屏蔽^[5],于是使得 DAGP 中 C_{1,1'}-OH 的 W 从棉酚分子的 6.4 向低场移动到 7.5~8.5,峰扁而宽,而 C_{6,6'}-OH 不管是在棉酚中还是在 DAGP 中,其周围化学环境变化都不大,所以 W 基本稳定在 5.8 附近。

为了验证上面提出 B 可能是 DAGP 的推测和对 B 的 ¹H NMR 的解析,实验中寻觅到双苯胺棉酚标样,做它与 B 同样实验条件的 ¹H NMR 试验,结果同列于表 3。比较表 3 中 B 和双苯胺棉酚(DAGP)的 ¹H NMR 数据,结果相符。

表 3 B 和 DAGP 的 ¹H NMR 数据

化合物	¹ H NMR(W, CDCl ₃ , TMS)	化合物	¹ H NMR(W, CDCl ₃ , TMS)
DAGP	14.80(1H, S, C _{7,7'} -OH)	B	14.75(1H, S, <u>C_{7,7'}-OH</u>)
	10.18(1H, S, C _{9,9'} -H)		10.15(1H, S, <u>C_{9,9'}-H</u>)
	7.5~8.5(1H, S, C _{1,1'} -OH)		7.5~8.5(1H, S, <u>C_{1,1'}-OH</u>)
	7.62(1H, S, C _{4,4'} -H)		7.62(1H, S, <u>C_{4,4'}-H</u>)
	7.28(5H, S, Ar-H)		7.28(5H, S, <u>Ar-H</u>)
	5.78(1H, S, C _{6,6'} -OH)		5.80(1H, S, <u>C_{6,6'}-OH</u>)
	3.82(1H, m, J(CH-CH ₃) = 7.0Hz, C _{5,5'} - (Me) ₂ CH)		3.85(1H, m, J(CH-CH ₃) = 7.0Hz, <u>C_{5,5'}- (Me)₂CH</u>)
	2.14(3H, S, C _{3,3'} -CH ₃)		2.16(3H, S, <u>C_{3,3'}-CH₃</u>)
	1.54(6H, d, J(CH ₃ -CH) = 7.0Hz, C _{5,5'} - (CH ₃) ₂ C)		1.54(6H, d, J(CH ₃ -CH) = 7.0Hz, <u>C_{5,5'}- (CH₃)₂C</u>)

* 表中划横线的基团是根据 B 不同化学环境 H 的化学位移,偶合常数,质子数和裂分的峰数与标样 DAGP 比较后确定的。

图 2 双苯胺棉酚(DAGP)的分子结构

3 结 论

1) 由于 B和双苯胺棉酚 (DAGP)的¹HNM R数据一致,所以可以说明“棉酚制品”中使用的一组分实际不是棉酚而是一种棉酚经改性了的化合物双苯胺棉酚 (DAGP),“棉酚制品”中其他组分的分子结构已由红外光谱确证,也均未发现有棉酚存在

2) 实验证实 B就是双苯胺棉酚,它具有 SHIFF碱形式的亚胺基,在硫酸溶液中水解后可以形成胺和含醛基的棉酚,这正好印证化学法的实验结果。

致 谢

感谢科研处周俊康老师对该研究工作的支持,华聘聘、张大煜两位老师为本实验提供标样,在此表示衷心感谢。

参 考 文 献

- 1 Stipanovic R D, et al. J Am Oil Chem Soc, 1973, 50(11): 462
- 2 杨薇曼等. 波谱学杂志, 1989, 6(2): 209
- 3 洪少良. 有机化合物剖析技术基础. 北京: 化学工业出版社, 1983
- 4 [英] 威廉·凯勃著, 黄宪等译. 有机定性分析. 浙江科技出版社, 1985
- 5 易大年等. 核磁共振波谱 - 在药物分析中的应用. 上海科技出版社, 1985
- 6 杨文火等. 核磁共振原理及其在结构化学中的应用. 福建科技出版社, 1988
- 7 赵天增. 核磁共振氢谱. 北京大学出版社, 1983. 273
- 8 毕震等. 医药工业, 1980, 10 8
- 9 彭勤纪等. 波谱学杂志, 1989, 6(2): 169
- 10 包明等. 波谱学杂志, 1996, 13(1): 81

Application of ¹HNMR on Structure Study of a Component In "Gossypol Product"

Ding Shaodong Tao Guanjan Zhu Yaochu

(Center Research Institute, Wuxi University of Light Industry, Wuxi, 214036)

Abstract In order to determine the molecular structure of a component in "Gossypol product", the chemical tests proved that this Component was an Organonitrogenous Compound. In this paper, the ¹HNM R Spectral of mould compound gossypol was assigned. Based on this, the component's possible molecular structure was deduced from its ¹HNM R spctral lines. The structure was confirmed by the test using dianiline gossypol as a standard sample.

Key-words ¹ HNM R; gossypol; dianiline gossypol