文章编号:1673-1689(2010)01-0081-03

碱—酶法提取硫酸软骨素的工艺研究

吴枫楠

(吉林龙谷生物科技有限公司, 吉林 132101)

摘要: 研究以猪软骨组织为原料,采用碱液提取和酶解相结合的方式提取硫酸软骨素。通过对影响碱液提取效率和酶解效果因素的研究,确定了碱液提取的最佳条件为:碱液的体积分数 7.5%、提取温度为 50℃、提取时间 2 h、提取 2 次。酶解的最佳条件为:采用木瓜蛋白酶和胰蛋白酶的混合酶 1:1(w/v)、添加质量分数 1.0%、pH 值 8、提取 36 h。

关键词: 硫酸软骨素;碱—酶法;木瓜蛋白酶;胰蛋白酶;猪软骨

中图分类号:Q 81

文献标识码:A

Extraction of Sulphuric Acid Cartilage Biotin by Alkali-Enzyme Process

WU Feng-nan

(Rongoo Jilin Biological Technology Co. Ltd., Jilin 132101, China)

Abstract: This aims of this study is to develop an efficient extraction process of chondroitin sulfate from pig cartilage by Alkali-enzyme hydrolysis. For this, the optimum conditions were determined and listed as follows: Density 7.5%, Temperature 50℃, Time 2 h, two times. the optimum conditions to extracted enzyme are as follow: Mixed enzyme with quince protein enzyme and trypsin(1:1)、Additive Quantity: 1.0%, pH =8、Extracting 36 h.

Key words: chondroitin sulfate, alkali-enzyme method, quince protein enzyme, trypsin, pig cartilage

硫酸软骨素(Chondroitin Sulfate,简称CS)是存在于动物软骨组织中的多种酸性多糖的混合物,主要通过共价键与核心蛋白质相连,以蛋白聚糖的形式存在。具有多种同分异构体,根据硫酸基在半乳糖上的位置不同主要分为硫酸软骨素A(CSA)和硫酸软骨素B(CSC)^[1]。

硫酸软骨素具有多种生物活性。由于硫酸软骨素具有降低血脂、抗病毒、提高免疫力、抗衰老等功能,被广泛应用于临床和生物医学中。

硫酸软骨素的提取方法主要有:高温高压、中性盐法、碱法、酶解法等,本文采用碱法和酶解法相

结合的办法,着重对影响提取的关键步骤进行了研究,从而得到一条优化的生产途径。

1 材料与方法

1.1 主要材料与设备

猪软骨组织(市售),活性炭,胰蛋白酶(活力1 250),木瓜蛋白酶(活力1 3 000),胃蛋白酶(活力1 3 000)。

721型分光光度计:上海第三分析仪器厂;DHG-06型系列电热恒温鼓风干燥箱:武汉海声达仪器设备有限公司;HH-2数显恒温水浴锅:江苏

收稿日期:2008-11-04

作者简介:吴枫楠(1982-),男,蒙古族人,吉林人,助理工程师,主要从事生物技术研究及新产品研发工作。

Email:wunan8866@163.com

金坛市荣华仪器制造有限公司; LD4_2A 型电动离心机:北京医用离心机厂; PHS—25 型酸度计:上海雷磁仪器厂;抽滤机,JA2002 电子天平。

1.2 试验方法

1.2.1 生产工艺流程

猪软骨组织 预处理 粉碎 碱液浸
清液 1 ————— 清液 2

泡 粗滤 残渣 二次碱提 过滤混合
酶解 活性炭吸附 纯化 脱水干燥 成品。^[2]

1.2.2 最佳工艺条件的确定方法

1) 碱液提取条件的确定方法 由于硫酸软骨素通过共价键与核心蛋白相连接,以蛋白糖的形式存在,因此需以某种方法使共价键断裂,从而使硫酸软骨素释放出来,而碱液可较好的使共价键破裂,而且硫酸软骨素分子上的硫酸基比较稳定,在碱液作用下硫酸软骨素分子结构和分子质量一般不会发生变化,因此本实验采用加入碱液的办法提取硫酸软骨素。实验中以影响碱提效果的主要因素:碱液浓度,提取时间,提取次数,提取温度为试验因子,采用正交试验对提取工艺进行优化。

2) 酶解条件的确定方法 为进一步提高硫酸软骨素的提取效果,同时提高产品的纯度,本实验采用外加蛋白酶的办法去除蛋白质。首先通过单因素试验确定最佳的分解酶,然后在酶确定的基础上,通过以影响酶解的主要因素:酶解温度、pH、酶的添加量、酶解时间为试验因子进行正交试验,对试验条件进行优化^[3]。

3) 活性炭吸附 酶解后酶解液 pH 值在 8 左右,滴加盐酸调节水解液 pH 值至 6.5~7.0,温度控制在 50,在搅拌下 1:1(W/V)加入颗粒状活性炭,搅拌吸附 1h,然后用盐酸调节 pH 值为 5.0~5.5,并加入 2 g/dL 量的氯化钠,升温近至(85 左右)保温 30 min,趁热用 8 层纱布过滤,滤液再用滤纸过滤两次得澄清的硫酸软骨素液。

4) 纯化脱色 在经过活性炭吸附后的溶液中加入乙醇,使乙醇体积分数达到 65%~70%并静置过夜,次日可得胶状沉淀。所得沉淀用无水乙醇及丙酮各洗涤 2~3 次,然后过滤,滤渣置 60~65 的真空干燥箱中干燥,即得白色的硫酸软骨素粉^[4]。

1.3 分析方法

蛋白质含量的测定:Folin-酚试剂法

产品总得率(%) = (干品硫酸软骨素的质量(g)/干燥猪软骨组织的质量(g) × 100 %)^[5]

游离氨基酸总量:茚三酮比色法^[6]

2 结果与讨论

2.1 碱液提取条件的确定

准确称取 9 份 50g / 份的软骨组织粉末于 500 mL 的烧杯中,在料液比为 1:2 的基础上,以碱液浓度、提取时间、提取温度、提取次数 4 个因素进行正交试验(见表 1,2)。

由表 1,2 可知:影响碱液提取的因素依次为: $B > A > C > D$,即碱液浓度对提取的影响最大,提取温度次之,而提取时间和提取次数对提取的影响相对较小。在料液比为 1:2 时碱液提取的最佳组合为 $A_2 B_2 C_2 D_1$ 即:提取温度 50、碱液体积分数 7.5%、提取 2 次、提取时间 24 h。

表 1 碱液提取的因素水平表

Tab. 1 Factors and levels form of alkalin extraction

水平	因素			
	提取温度/ A	碱液体积分数/ B	提取次数 C	提取时间/h D
	1	40	5.0	1
2	50	7.5	2	36
3	60	10	3	48

表 2 碱液提取的正交试验表

Tab. 2 Orthogonal test table of alkali extraction

序号	因素				得率/%
	A	B	C	D	
1	1	1	1	1	6.13
2	1	2	2	2	6.65
3	1	3	3	3	5.18
4	2	1	2	3	6.77
5	2	2	3	1	7.16
6	2	3	1	2	5.72
7	3	1	3	2	5.62
8	3	2	1	3	5.97
9	3	3	2	1	5.56
K_1	5.99	6.17	5.94	6.28	
K_2	6.55	6.59	6.33	6.00	
K_3	5.72	5.49	5.99	5.97	
R	0.83	1.1	0.39	0.31	

2.2 酶解条件的确定

2.2.1 酶种类的选择 硫酸软骨素与核心蛋白以共价键相连。碱液提取后,为进一步将蛋白质降解,使硫酸素释放出来,本实验采用各种不同的蛋白酶进行降解试验,从而确定最佳分解酶。准确称量 4 份 50 / 份的软骨组织粉末于 500 mL 的烧杯中,在 pH 值 8.0、温度 55、酶添加量为 1.5% 的情况下提取 24 h,然后采用茚三酮与游离氨基酸的显色反应确定蛋白质的降解程度。

表 3 酶种类的选择

Tab. 3 The selection of enzyme

酶种类	胃蛋白酶	木瓜蛋白酶	胰蛋白酶	混合酶
显色结果	-	+	+	++

注“+”号表示颜色深浅,混合酶指木瓜蛋白酶和胰蛋白酶(1:1)混合酶

由表 3 可知:在相同的作用条件下,木瓜蛋白酶和胰蛋白酶混合酶作用效果最好,而木瓜蛋白酶和胰蛋白酶的作用效果次之且相似,胃蛋白酶的效果较差。因此本实验采用添加木瓜蛋白酶和胰蛋白酶混合酶(1:1)的方法提取硫酸软骨素。

2.2.2 酶解条件的确定

在酶的种类确定的情况下,准确称取 9 份 50g / 份的软骨组织粉末于 500 mL 的烧杯中,以影响酶解的四个因素:酶解温度、pH、添加量、酶解时间进行正交试验(见表 4,5)。

由表 4,5 可知:各因素对酶解的影响依次为:A > B > C > D,即酶解的温度对酶解效果的影响最大,酶的添加量次之,酶解的 pH 和酶解时间影响相对较小。通过极差分析得最佳的酶解条件为 A₁B₂C₁D₂,即酶解温度为 45、混合酶添加量为 1.0%、酶解 pH 为 8、酶解时间 36 h。

表 4 酶解正交试验因素水平表

Tab. 4 Factors and levels from of enzyme hydrolysis

水平	因素			
	酶解温度/	酶质量分数/%	酶解 pH	酶解时间/h
	A	B	C	D
1	45	0.5	8	24
2	50	1.0	9	36
3	55	1.5	10	48

参考文献(References):

- [1] 卢学根. 羊软骨粘多糖的酶法提取工艺研究[J]. 食品工业科技, 2007(10) 184 - 185.
LU Xue-gen: The research of extraction technology of chondroitin sulfate mucopolysaccharides with enzymes from eggshell membrane[J]. *Science and Technology of Food Industry*, 2007(10) 184 - 185. (in Chinese)
- [2] 武中会. 碱液对牦牛软骨素提取硫酸软骨素工艺的影响[J]. 兽禽业, 2008(6).
WU Zhong-hui. Influence on craft of the lye about extract the chs from yak's cartilage[J]. *Livestock and Poultry Industry*, 2008(6). (in Chinese)
- [3] 刘国庆, 凌庆枝, 孙军飞. 蛋壳膜硫酸软骨素的提取工艺及其优化[J]. 食品科学, 2007(9) 283 - 285.
LIU Guo-qing, LING Qing-zhi, SUN Jun-fei. Optimization of extraction technology of chondroitin sulfate from eggshell membrane[J]. *Food Science*, 2007(9) 283 - 285. (in Chinese)
- [4] 赵培城, 高红林, 朱顺达. 猪硫酸软骨素提取工艺研究[J]. 食品科学, 2004(4) 14 - 17.
ZHAO Pei-cheng, GAO Hong-lin, ZHU Shun-da. Study on the extraction technology of the chondroitin sulfate of pig[J]. *Food Science*, 2004(4) 14 - 17. (in Chinese)
- [5] 舒坤贤, 等. 中华鲟硫酸软骨素提取工艺研究[J]. 食品工业科技, 2006(3) 151 - 155. 28 - 30.
SHU Kun-xian. study on the extraction technology of chondroitin sulfate from acipenser sinensis grdy cartilage[J]. *Science and Technology of Food Industry*, 2006(3) 151 - 155. 28 - 30. (in Chinese)
- [6] 大连轻工业学院, 华南理工大学等合编[M]. 食品分析, 中国轻工业出版社, 2002.

(责任编辑:杨萌)

表 5 酶解的正交试验表

Tab. 5 Orthogonal test of enzyme hydrolysis

序号	因素				蛋白质质量分数/%
	A	B	C	D	
1	1	1	1	1	2.42
2	1	2	2	2	2.30
3	1	3	3	3	2.67
4	2	1	2	3	2.96
5	2	2	3	1	2.72
6	2	3	1	2	2.62
7	3	1	3	2	2.83
8	3	2	1	3	2.51
9	3	3	2	1	3.01
K ₁	2.46	2.74	2.52	2.72	
K ₂	2.77	2.51	2.76	2.58	
K ₃	2.78	2.77	2.74	2.71	
r	0.32	0.26	0.24	0.14	

3 结 语

1) 本文研究以猪软骨组织为原料,通过预处理等工序制得软骨组织粉末,然后在不同的条件下进行提取试验,从而确定了碱液提取的最佳条件为:碱液体积分数 7.5%、提取温度 50、提取时间 24 h,提取 2 次,酶解的最佳条件为:以木瓜蛋白酶和胰蛋白酶混合酶为降解酶,在温度为 45、pH 值为 8、混合酶添加质量分数为 1.0%的条件下酶解时间 36 h。

2) 最终产品呈白色,略带咸味、无臭,具有较强的吸水性,加热不凝结,易溶于水并形成粘稠溶液,不溶于酒精、乙醚、丙酮等有机溶剂。

3) 主要检测结果为产品总得率为 24.4%、硫酸软骨素质量分数 92%、蛋白质质量分数 2.35%、含水质量分数为 8.72%、酸碱度为 6.5。