乙醇对角质酶性质的影响

王莉¹, 王淼^{*1,2}

(1. 江南大学 食品学院, 江苏 无锡 214122; 2. 食品科学与技术国家重点实验室, 江南大学, 江苏 无锡 214122)

摘要: 研究了乙醇溶液对角质酶性质的影响, 同时用圆二色光谱和荧光光谱法对经过硫酸铵沉淀、镍柱亲和层析等方法获得的电泳纯角质酶进行了构象研究。结果表明, 在体积分数 40%、30% 和 20% 乙醇溶液中角质酶催化反应的最适温度分别为 50、55 和 65 °C; 在 37 °C 下, 酶在体积分数 20%~50% 乙醇中具有较好的稳定性, 体积分数 30% 和 40% 乙醇对角质酶具有激活作用; 角质酶在体积分数 30% 和 50% 乙醇中催化反应的最适 pH 分别为 9.5 和 9.0; 在体积分数 30% 乙醇溶液中角质酶的 pH 稳定范围为 6.5~10.5。角质酶在 50 °C 的乙醇溶液中的失活动力学研究表明, 角质酶的失活属于一级动力学反应($R^2 > 0.98$)。从角质酶构象的研究结果可以看出, 在乙醇体系中角质酶的二级结构和三级结构都发生了相应的变化。

关键词: 角质酶; 乙醇; 酶学性质; 构象

中图分类号: Q 814.9 文献标识码: A 文章编号: 1673-1689(2012)01-033-07

Effect of Ethanol on the Property of Cutinase

WANG Li¹, WANG Miao^{*1,2}

(1. The School of Food Science and Technology, Jiangnan University, Wuxi 214122, China; 2. State Key Laboratory of Food Science and Technology, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract: In this manuscript, effect of ethanol solutions on the biochemical property and conformation of cutinase were studied. The results showed that the optimum temperatures of cutinase were 65 °C, 55 °C and 50 °C respectively in 20%(V/V), 30% and 40% ethanol solutions. In 20% and 50% ethanol solutions cutinase was stable at 37 °C. In 30% and 50% ethanol solutions the optimum pH of cutinase were 9.5 and 9.0 respectively. In 30% ethanol solution the pH stability range of cutinase was 6.5-10.5. In 30% and 40% ethanol solutions activity of cutinase at 37 °C was enhanced. The inactivation kinetic of cutinase was researched in ethanol solutions at 50 °C. The results showed that the inactivation kinetic of cutinase in ethanol solutions followed the first order reaction($R^2 > 0.98$). And the secondary and the tertiary structure conformations greatly changed in ethanol solutions.

Key words: cutinase, ethanol, enzymatic property, conformation

生物酶作为高效的生物催化剂, 传统意义上是在水溶液中进行的, 但是, 目前对其在有机溶液中

的催化反应已经倍受关注, 酶学领域也有了一个全新的分支—非水酶学^[2]。通常认为在极性溶剂中

收稿日期: 2011-03-23

基金项目: 国家自然科学基金项目(20776063); 国家计划 863 项目(2011AA100905)。

* 通信作者: 王淼(1962-), 女, 江苏无锡人, 工学博士, 教授, 博士研究生导师, 主要从事食品生物化学方面的研究。

Email: mwang@jiangnan.edu.cn

酶的稳定性较差,大部分非水相酶反应均被限制于相对非极性的溶剂中。一方面非极性溶剂利于提高酶的稳定性,另一方面,在非极性溶剂中酶易于保持其活性构象而表现出高的催化活力。极性有机溶剂会争夺酶分子表面的结构水,使酶失活。因此,对酶在有机溶剂中性质及稳定性的研究主要集中与非极性溶剂中^[3,4]。

角质酶是一种可以降解角质并产生大量脂肪酸单体的水解酶,是 α/β 水解酶家族中相对分子量较小的成员,其活性中心含有典型的催化三元组(Ser₁₂₀、His₁₈₀、Asp₁₇₅),具有酯酶和脂肪酶的功能^[5]。角质酶可降解不溶性甘油三酯、可溶性酯和角质等聚酯,也能破坏角质多聚物分子的酯键使其水解为单体和小分子寡聚体^[6-7]。它作为一种多功能水解酶,在食品、化工及纺织等诸多领域都具有广泛的应用^[7-9]。

目前,国内关于角质酶的研究较少,国外对角质酶的研究大多集中于酶学性质、结构以及生产菌株构建、以及酶在反胶束体系中的性质及应用^[10-12],虽然有研究表明角质酶在体积分数75%乙醇中20℃下放置18h活力基本不丧失^[13],但并未对酶在乙醇体系中的性质进行系统研究。乙醇在工业中被广泛应用,是一种良好的有机溶剂,许多食品原料中功能性成分的提取都是用乙醇作为溶剂的,研究角质酶在乙醇中的催化性质,将有助于扩大角质酶的应用范围。

1 材料与方法

1.1 实验材料

角质酶发酵液:作者所在实验室提供;对硝基苯丁酸酯(*p*NPB)、硫磺脱氧胆酸:购自Sigma公司;其它试剂均为分析纯试剂。

1.2 实验仪器

ARB 120 电子天平:尤尼柯上海仪器有限公司产品;AB 204-N 电子天平:上海森信实验仪器有限公司产品;EL20 型 pH 计:梅特勒-托利多仪器有限公司产品;Backman Coulter(USA)台式冷冻离心机:上海力申科学仪器有限公司产品;V-1800 型可见分光光度计:上海美谱达仪器有限公司产品;F-7000 荧光光谱仪:日本日立公司产品;MOS-450 AF-CD 圆二色光谱仪:法国 Bio-logic 公司产品。

1.3 试验方法

1.3.1 *p*NPB 水解酶活力的测定 分光光度法。酶活在 20℃ 下测定,反应体积为 1 mL,其含 20 μ L 酶液、50 mmol/L 对硝基苯丁酸酯和 50 mmol/L 硫磺脱氧胆酸钠 pH 为 8.0 的缓冲液 980 μ L。在 405 nm 记录对硝基酚的生产速率。酶活定义:20℃ 下,每分钟催化对硝基苯丁酸酯水解 1 μ mol 对硝基酚的酶量为一个酶活力单位^[1,14]。

1.3.2 酶的分离与纯化 将发酵液于 4℃、10 000 r/min 离心 20 min 去除菌体,上清液经质量分数 50% 的硫酸铵盐析,4℃、10 000 r/min 离心 20 min,得沉淀并透析,经 0.45 μ m 的滤纸微滤,然后经镍柱进行亲和层析,得纯酶制品。

1.3.3 蛋白质含量测定 福林酚法。

1.3.4 SDA-PAGE 分析 分离胶质量浓度为 12 g/dL,浓缩胶质量浓度为 2.5 g/dL,电泳采用 pH 8.3 的 Tris-HCl 缓冲体系,电泳后用考马斯亮蓝 G250 染色。

1.3.5 角质酶性质的研究 角质酶性质研究采用硫酸铵分级沉淀、透析后的粗酶液。

1) 角质酶在乙醇溶液中的最适反应温度 以 *p*NPB 为底物,用不同体积分数乙醇溶液(20%、30%、40%、50%)配制 pH 8.0、20 mmol/L 的缓冲液代替 *p*NPB 水解酶活测定方法中的缓冲液,在不同温度下(37~70℃)测定酶的剩余活力,以天然酶活力为 100%,确定该酶在不同体积分数乙醇溶液中的最适反应温度。

2) 角质酶在体积分数 30% 和 50% 乙醇溶液中的最适反应 pH 值 分别用体积分数 30% 和 50% 的乙醇溶液配制不同 pH 值(6.0~11.0)的缓冲液,代替 *p*NPB 水解酶活测定方法中的缓冲液,在其最适反应温度下测定酶的残余活力,以天然酶活力为 100%,研究酶在体积分数 30% 和 50% 乙醇溶液中最适作用 pH。所用的缓冲液体系是用体积分数 30% 和 50% 乙醇溶液配制,分别为:20 mmol/L 磷酸缓冲体系(pH 6.0~7.0);20 mmol/L Tris-HCl 缓冲液体系(pH 7.5~9.0);20 mmol/L 磷酸氢二钠-NaOH 缓冲体系(pH 9.5~11.0)。

3) 角质酶在乙醇溶液中的热稳定性 为了研究该酶在不同体积分数乙醇溶液(20%、30%、40%、50%)中的热稳定性,将酶液按一定比例分别与不同体积分数乙醇溶液配制的 pH 8.0 20 mmol/L

L Tris-HCl 缓冲液混合在 37、45、50 和 55 °C 保温,每隔一定时间取出部分酶液,立即在冰浴中冷却,按 pNPB 水解酶活力测定方法测定残余酶活。

4) 角质酶在体积分数 30% 和 50% 乙醇溶液中的 pH 稳定性 将酶在 37 °C、不同 pH 值(pH 6.0~11.0)的缓冲液中放置 12 h,每隔一段时间取出部分酶液,按 pNPB 水解酶活力测定方法测定残留酶活。缓冲液体系同 1.3.7。

5) 酶在乙醇溶液中的失活动力学 将酶液按一定比例分别与体积分数 20%、30%、40%、50% 乙醇溶液配制的 pH 8.0、20 mmol/L Tris-HCl 缓冲液混合,在 50 °C 下放置一定时间,每隔一定时间取出部分酶液,按 pNPB 水解酶活力测定方法测定残余酶活。

根据 Arrhenius 方程 $\ln A = -kt$ 和 $\ln k = \ln k_0 - (E_0/RT)$ 计算失活动力学参数。其中 A 是酶活, U/ml; T 是绝对温度, K; E_0 是活化能; $t_{1/2}$ 是半衰期, min; t 是保温时间, min; R 是气体常数, 8.314 510 J/(K·mol); k 是速率常数, 1/min。

1.3.6 角质酶在醇溶液中的构象 圆二色光谱检测:将纯化后的样品溶解于 pH 8.0、20 mmol/L 的 Tris-HCl 缓冲液中室温放置 30 min,立即冰浴;样品溶解于体积分数 30%、50% 乙醇溶液配制的 pH 8.0、20 mmol/L Tris-HCl 缓冲液中,各自分别在 37 °C、50 °C 下放置 30 min,立即冰浴。蛋白质质量浓度为 0.1 mg/mL。测定远紫外区(190~250 nm) CD 谱,扫描速度 1 nm/s,重复 5 次。圆二色谱用平均椭圆度 $[\theta]$ 表示,单位为度·厘米²分摩尔(deg·cm²·dmol⁻¹)。

荧光光谱检测:样品处理方式同圆二色光谱检测。荧光扫描采用 F-7000 FL 型分光光度计,激发波长为 280 nm,发射波长为 290~450 nm^[15-20]。

2 结果与分析

2.1 角质酶的分选纯化

将含有角质酶的发酵液通过硫酸铵分级盐析、透析、镍柱亲和层析进行分离纯化,纯化表见表 1,得到的样品通过 SDS-PAGE 凝胶电泳检测只显出一条谱带,说明纯化的角质酶已达到电泳纯(图 1)。纯化后 pNPB 水解酶比活力从 19.02 U/mg 提高到 116.28 U/mg,纯化倍数为 6.12,回收率为

9.75%,以上各步的纯化结果如表 1 所示。

Lane 1: Purified cutinase; Lane 2: Molecular weight marker (A, 97 400; B, 66 200; C, 43 000; D, 31 000)

图 1 pNPB 水解酶的 SDS-PAGE 凝胶电泳
Fig. 1 SDS-PAGE of cutinase

表 1 角质酶纯化过程参数

Tab. 1 The parameters of cutinase purification

纯化过程	总酶活/U	回收率/%	总蛋白质/mg	比酶活/(U/mg)	纯化倍数
粗酶液	37 384.40	100.00	1 965.95	19.02	1.00
盐析	37 111.95	99.27	975.45	38.05	2.00
透析	36 858.64	98.59	896.06	41.13	2.16
镍柱层析	3 646.68	9.75	31.36	116.28	6.12

2.2 角质酶在乙醇溶液中的性质

2.2.1 乙醇体积分数对角质酶最适反应温度的影响

温度是影响酶催化作用的主要因素之一,一方面随着温度的升高,化学反应速度加快,另一方面高温会使酶变性失活,有机溶剂的加入也会影响酶反应的最适温度。因此,需要通过实验确定酶在有机介质中酶催化的最适温度,以提高酶催化反应速率。

在不同体积分数乙醇溶液中,角质酶的最适反应温度也不同,且不同于酶在正常情况下的最适用温度 60 °C^[1]。由图 2 可知,体积分数 20%、30% 和 40% 乙醇溶液中,酶的最适反应温度分别为 65 °C、55 °C 和 50 °C,且当乙醇体积分数低于 40% 时,角质酶的催化活力明显高于其在缓冲液中,该体系对角质酶具有激活作用,在体积分数 30% 乙醇溶液中的酶活力最高可达缓冲液中的 2.14 倍,当乙醇体积分数达到 50% 时,酶活力显著降低。有研究表明

上述现象可能是由于适当体积分数的乙醇改变了酶的构象,从而使酶分子更有利于与底物接触进行催化反应,当乙醇浓度过高时,它对酶构象的改变超出了酶的承受能力,使酶变性,酶活力下降甚至失活^[2]。

图 2 不同体积分数乙醇中角质酶的最佳反应温度

Fig. 2 Optimal temperature of cutinase in ethanol solutions

2.2.2 角质酶在乙醇溶液中的热稳定性研究

角质酶在乙醇溶液中热稳定性研究表明(见图 3)。在体积分数 20%乙醇溶液中,45℃以下酶活基本保持不变,酶相对稳定。温度高于 45℃时,随着温度的升高,酶的稳定性显著降低(图 3(a));在体积分数 30%乙醇溶液中,37℃时酶稳定性较好,在此条件下保温 100 min 后,残余酶活仍比在缓冲液中的原始酶活高。但在 45℃下酶的稳定性有所下降,且随着温度升高酶稳定性快速下降(图 3(b));当乙醇体积分数为 40%~50%时,酶只在 37℃具有较好的热稳定性(图 3(c)、(d))。这说明酶在高体积分数的乙醇溶液中,只有在低温下具有较好的稳定性。角质酶在水溶液中 40℃下保温 70 h,残留酶活仍在 80%以上;在 60℃时半衰期为 42 h。^[1]与此相比在乙醇溶液中热稳定性有所下降。乙醇是与水互溶的极性溶剂,会与酶争夺水分子,甚至剥除蛋白质分子的“必需水”层,扰乱酶分子天然构象的形成^[3],在乙醇存在的条件下,高温更易使酶变性,从而使酶在醇中的稳定性降低。

图 3 角质酶在乙醇溶液中的热稳定性 (a、b、c、d 分别为角质酶在体积分数 20%、30%、40%和 50%乙醇中的热稳定性)

Fig. 3 Thermostability of cutinase in ethanol solutions a (20%), b(30%), c(40%) and d(50%)

2.2.3 角质酶在乙醇溶液中的最适 pH 值

由上述研究结果可知角质酶在体积分数 30%乙醇溶液中的催化活性最高,当乙醇体积分数大于 30%时,角质酶的催化活性下降,达到体积分数 50%时只在 37℃下有一定的稳定,选择研究体积分数 30%和 50%乙醇中角质酶的最适反应 pH 值具有代表性。前人研究表明,角质酶在水溶液中的最适 pH 8.0^[1],乙醇对角质酶最适 pH 值的影响如图 4 所示,角质酶在乙醇溶液中的最适反应 pH 值发生了改变,在体积分数 30%、50%乙醇溶液中的最适反应 pH 值分别为 9.5 和 9.0,在体积分数 30%乙醇

溶液中 pH 8.0~10.0 范围内酶活变化不大,但均比在水溶液中有大幅提高,当 pH 为 9.5 时,最大活力是水中的 2.45 倍。很多研究表明酶在有机介质中催化反应的最适 pH 值通常与酶在水溶液中反应的最适 pH 值接近或相同^[4,16],这主要是针对非极性有机溶剂而言,乙醇是与水互溶的极性溶剂,它对角质酶的激活效应有待进一步探讨。

图 4 角质酶在体积分数 30%、50%乙醇中的最适反应 pH 值
Fig. 4 Optimal pH of cutinase in ethanol solutions

2.2.4 角质酶在乙醇溶液中的 pH 稳定性 由角质酶在乙醇溶液中最适反应温度和温度稳定性可知,37 °C 时角质酶在体积分数 50% 以下的乙醇溶液中都具有一定的稳定性,且角质酶在体积分数 30% 乙醇溶液中活性最高;从角质酶在乙醇溶液中最适反应 pH 的研究结果可知,角质酶在体积分数 50% 乙醇溶液具有一定的酶活,且乙醇作为一种食品级的有机溶剂,高体积分数的乙醇在工业中被广泛应用,因此研究角质酶在体积分数 50% 乙醇中的 pH 稳定性是有必要的。角质酶在乙醇中的 pH 稳定性如图 5 所示,在体积分数 50% 乙醇溶液中,角质酶的 pH 稳定性较差,短时间内,在 pH 6~7 的范围内有一定稳定性,当 pH 到 9.0 时,酶的稳定性迅速下降(图 5(a)),而在 30% 乙醇溶液中,角质酶较稳定,pH 稳定范围为 pH 6.5~10.5(见图 5(b))。

图 5 角质酶在体积分数 50% (a)、30% (b) 乙醇中的 pH 稳定性

Fig. 5 pH stability of cutinase in ethanol solutions (a) (50%) and (b) (30%)

2.2.5 角质酶在乙醇溶液中的失活动力学 为了进一步探索分析不同体积分数乙醇对角质酶活力的影响,作者对 50 °C 下角质酶的失活动力学进行研究,不同乙醇体积分数下角质酶的失活动力学曲线见图 6 所示。

图 6 角质酶在醇溶液中的失活动力学曲线
Fig. 6 Inactivation curves of cutinase in ethanol solutions

从图 6 可以看出,角质酶的失活反应基本符合一级反应动力学的规律,利用 Arrhenius 方程可以计算出各种失活动力学参数,结果如表 2 所示。

从表 2 可以看出,随着醇体积分数的增大,酶的失活速率常数增加,失活的活化能下降。角质酶在体积分数 20% 乙醇溶液中半衰期为 71.63 min,而在体积分数 50% 乙醇溶液中其半衰期迅速下降到 5.23 min。这说明 50 °C 下角质酶会很快失活。酶失活的活化能 E_0 与角质酶的稳定性有关, E_0 越大角质酶越稳定,由此也可以看出随着醇体积分数

的增大,角质酶的稳定性在下降。

表 2 角质酶在醇溶液中的失活动力学参数

Tab. 2 The inactivation kinetic parameters of cutinase in ethanol solutions

乙醇 体积分数/%	失活速率 常数 k	活化能 E_0 (J)	半衰期 $t_{1/2}$ (min)
20	0.009 6	17 636.07	71.63
30	0.053 1	12 997.22	13.89
40	0.105 6	11 106.91	6.86
50	0.118 6	10 712.08	5.23

2.2.6 角质酶在醇溶液中的构象 上述研究表明角质酶在 37 °C 体积分数 30% 的乙醇溶液中具有较高活性,且有较好的稳定性,为此,作者对角质酶的构象进行了研究。图 7 是角质酶在不同温度下、不同体积分数的乙醇溶液中放置 30 min 后测得的圆二色谱。

图 7 不同方式处理后角质酶的圆二色谱

Fig. 7 Circular dichroism spectrums of cutinase incubated 30min in different ways

从图 7 可以看出,在不同体积分数的乙醇溶液中角质酶 CD 光谱有较大差别,通过 SELCON3 软件分析,得出角质酶在不同体系中 α 螺旋、 β 折叠、 β 转角及无规则卷曲的比例(见表 3)。从表 3 的数据可以看出,酶的相对活力与其二级结构之间没有明显的相关性。因此作者采用荧光光谱法对酶蛋白的三级结构进行进一步的研究。图 8 是不同体系中角质酶的荧光发射光谱,角质酶在 336~342 nm 处有一特征荧光发射峰,但在 50 °C 下、体积分数 50% 乙醇中角质酶的荧光发射峰位红移至 342 nm,其他条件下角质酶的荧光发射峰未发生位移,只是荧光强度不同,对于活力较高的 37 °C 下 30% 乙醇中的角质酶,在 336 nm 的荧光强度明显低于其他

条件下角质酶的荧光强度。蛋白质在 340 nm 左右的荧光强度主要与蛋白质分子中 Trp 和 Tyr 残基的暴露和解离的程度有关 [2,21]。荧光发射光谱的变化与生色基团的微环境等多方面因素相关。由此推测,角质酶在 37 °C 下 30% 乙醇中三级结构发生了有利于催化活性的变化。

表 3 角质酶分子构象中各结构单元含量

Tab. 3 Secondary structural compositions of cutinase

处理方式	α 螺旋/%	β 折叠/%	β 转角/%	无规则 卷曲/%
缓冲液、常温	42.37	15.27	17.39	25.08
30%乙醇、37 °C	9.24	45.88	10.84	33.94
30%乙醇、50 °C	55.66	3.40	19.42	20.52
50%乙醇、37 °C	9.11	45.95	10.91	33.93
50%乙醇、50 °C	9.32	45.79	10.72	34.17

图 8 不同方式处理后角质酶的荧光发射光谱图

Fig. 8 Fluorescence intensity of cutinase incubated 30min in different ways

3 结 语

1)角质酶在低体积分数的乙醇溶液中的催化性质发生了变化。20%、30%、40%乙醇溶液中的最适温度分别为 65、55、50 °C。热稳定性研究表明,在 37 °C 下,酶在体积分数 20%~50%乙醇中都具有良好的稳定性。

2)角质酶在体积分数 30%和 50%乙醇中催化反应的最适 pH 分别为 9.5 和 9.0。在 30%乙醇溶液中角质酶的 pH 稳定范围为 6.5~10.5;在 50%乙醇溶液中角质酶的 pH 稳定性较差。

3)角质酶在 50 °C 的乙醇溶液中的失活动力学研究表明,角质酶的失活属于一级动力学反应 (R^2

>0.98)。

4)用 CD 光谱法和荧光光谱法对电泳纯的角质酶进行构象研究表明,角质酶的二级结构与其催化

活性没有明显相关性,但与三级结构有很大的相关性,且角质酶在 37 °C 下 30%乙醇中三级结构可能发生了有利于催化活性的变化。

参考文献(References):

- [1] 陈晟,陈坚,吴敬. 一种嗜热细菌来源角质酶的分离纯化及酶学性质[J]. 应用与环境生物学报,2009,15(6):846-850. CHEN Sheng, CHEN Jian, WU Jing. Purification and characterization of cutinase from a thermophilic bacterium[J]. **Chinese Journal of Applied and Environmental Biology**, 2009, 15(6): 846-850. (in Chinese)
- [2] 初志战,黄卓烈,巫光宏,等. 乙醇溶液对木瓜蛋白酶催化活性的影响[J]. 热带亚热带植物学报,2005,13(14):329-312. CHU Zhi-zhan, HUANG Zhuo-lie, WU Guang-hong, et al. Effect of ethanol on catalytic activity of papain[J]. **Journal of Tropical and Subtropical Botany**, 2005, 13(14): 329-312. (in Chinese)
- [3] 袁勤生. 现代酶学[M]. 上海:华东理工大学出版社,2001.
- [4] 罗贵民,曹淑桂,冯雁. 酶工程[M]. 北京:化学工业出版社,2008.
- [5] Mehdi Y M, Majid E M. The role of short-range Cys171-Cys178 disulfide bond in maintaining cutinase active site integrity: A molecular dynamics simulation[J]. **Biochemical and Biophysical Research Communications**, 2009, 390:201-204.
- [6] Marco N, Bauke W. α/β Hydrolase fold enzymes; the family keeps growing[J]. **Current Opinion in Structural Biology**, 1999, 9: 732-737.
- [7] Maarten R E, Jacob de V. Fusarium solani pisi cutinase[J]. **Biochimie**, 2000, 82: 1015-1021.
- [8] Cristina M, Maria R, Joaquim M S. Cabral cutinase: from molecular level to bioprocess development[J]. **Biotechnology and Bioengineering**, 1999, 66(1): 17-34.
- [9] WANG Ping, WANG Qiang. Effects of cutinase on the enzymatic shrink-resist finishing of wool fabrics[J]. **Enzyme and Microbial Technology**, 2009, 44: 302-308.
- [10] 张守亮,陈坚,华兆哲,等. Thermobifidafusca WSH 03-11 突变株合成角质酶的发酵条件[J]. 食品与生物技术学报,2006,25(5):44-48. ZHANG Shou-liang, CHEN Jian, HUA Zhao-zhe, et al. Optimization of fermentation conditions for cutinase production with a mutant of *Thermobifidafusca* WAH03-11[J]. **Journal of Food Science and biotechnology**, 2006, 25(5): 44-48. (in Chinese)
- [11] Melo E P, Costa S, Cabral J, et al. Cutinase-AOT interactions in reverse micelles: the effect of 1-hexanol[J]. **Chemistry and Physics of Lipids**, 2003, 124: 37-47.
- [12] Tomas T, Allan S M, Patrick A. Unfolding and inactivation of cutinase by AOT and guanidine hydrochloride[J]. **Biochimica et Biophysica Acta**, 2005, 1784: 74-83.
- [13] Chen Sheng, Su Lingqia, Billig S, et al. Biochemical characterization of the cutinase from *Thermobifida fusca*[J]. **Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic**, 2010, 63: 121-127.
- [14] Sheryl F, Gote J, Rajni H K. Purification of recombinant cutinase by extraction in an aqueous two-phase system facilitated by a fatty acid substrate[J]. **Biotechnology and Bioengineering**, 2001, 73(6): 465-475.
- [15] Merz J, Schembecker G, Stephanie RM. Nimtz et al. Purification and identification of a novel cutinase from *Coprinopsis cinerea* by adsorptive bubble separation[J]. **Separation and Purification Technology**, 2009, 69:57-62.
- [16] 郭勇. 酶工程[M]. 北京:科学出版社,2004.
- [17] 徐冬梅,刘广深,王黎明,等. 麦芽酸性磷酸酶与乙醇相互作用的谱学研究[J]. 光谱学与光谱分析,2004,24(11):1388-1390. XU Dong-mei, LIU Guang-shen, WANG Li-ming, et al. Spectroscopic analysis of the interaction of ethanol and acid phosphatase from wheat germ[J]. **Spectroscopy and Spectral Analysis**, 2004, 24(11):1388-1390. (in Chinese)
- [18] 陈巧,廖金花,林丽蓉,等. 乙醇对鲍鱼碱性磷酸酶活力与构象的影响[J]. 厦门大学学报:自然科学版,2005,44(4):563-565. CHEN Qiao, LIAO Jin-hua, LIN Li-rong, et al. Effect of ethanol on activity and conformation of alkaline phosphatase from *Haliotis diversicolor*[J]. **Journal of Xiamen University: Natural Science**, 2005, 44(4): 563-565. (in Chinese)
- [19] 陈清西,严思旭. 果菠萝蛋白酶在有机溶剂微扰时的分子折叠与活力变化的研究[J]. 高等学校化学学报,1993,14(3):424-427. CHEN Qing-xi, YAN Si-xu. Effect of organic solvents on the molecular folding and the enzyme activity of fruit bromelain [J]. **Chemical Journal of Chinese Universities**, 1993, 14(3): 424-427. (in Chinese)
- [20] Brissos E P, Melo J M, Martinho G, et al. Biochemical and structural characterization of cutinase mutants in presence of the anionic surfactant AOT[J]. **Biochimica et Biophysica Acta**, 2008, 1784: 1326-1334.
- [21] 陶慰孙,李惟,姜涌明. 蛋白质分子基础[M]. 北京:高等教育出版社,1995.