文章编号:1673-1689(2005)02-0046-04

L-丝氨酸产生菌的分离筛选及发酵条件

卢发, 张伟国

(江南大学 工业生物技术教育部重点实验室, 江苏 无锡 214036)

摘要: 在含 50 mL/L 的甲醇、5 g/L 的甘氨酸的基本培养基平板上, 从土壤中分离出 130 多株细菌, 测定了它们利用甘氨酸生产 L-丝氨酸的能力. 获得了一株产 L-丝氨酸较好的菌株 A3, L-丝氨酸产量最高为 1.4 g/L, 分类学鉴定为微球菌科(Micrococcaceae), 对菌株 A3 利用甘氨酸发酵生产 L-丝氨酸的发酵条件进行了初步研究, 包括甘氨酸和甲醇添加量, 不同碳源、氮源, 初始 pH 值以及发酵时间对产酸的影响. 结果表明, 菌株 A3 在不添加甲醇、只以甘氨酸为惟一碳源的发酵培养基中也能产 L-丝氨酸, 培养基中较高质量浓度的甘氨酸存在对 L-丝氨酸生产是必需的. 添加葡萄糖、甘油等外源碳源对菌体生长有利但不利于 L-丝氨酸的生产.

关键词: L-丝氨酸; 甘氨酸; 甲醇; 筛选; 微球菌科

中图分类号: TQ 920.6

文献标识码: A

Screening of L-Serine Producer and the Fermentation Conditions in Shake-Flask Culture

LU Fa, ZHANG Wei-guo

(The Key Laboratory of Industrial Biotechnology under Ministry of Education, Southern Yangtze University, Wuxi 214036, China)

Abstract: About 130 microorganisms isolated from soil on the minimal medium containing 50 mL/L methanol and 5 g/L glycine were examined for L-serine accumulation. Strain A3, a bacterium, was identified as *Micrococcaceae*. The strain produced 1.4 g/L L-serine when glycine was added in the growth medium. The cultural conditions of converting glycine to L-serine were investigated, including initial methanol and glycine concentration, carbon sources, nitrogen sources, initial pH of medium and time course of L-serine production. The results showed that the strain A3 could produce L-serine in shake culture at 31 °C in the medium containing glycine, the sole carbon source. The high concentration of glycine was necessary for L-serine accumulation during the fermentation. The addition of glucose, glycerol, etc. In the glycine containing medium was beneficial to the cell growth but not favorable for the production of L-serine.

Key words: L-serine; glycine; methanol; screening; micrococcaceae

L-丝氨酸(L-Serine), 化学名为 2-氨基-3-羟基丙酸, 是一种生糖氨基酸, 在体内可由 D-甘油酸作

收稿日期: 2004-06-01; 修回日期: 2004-09-03.

作者简介: 卢发(1978-), 男, 安徽潜山人, 生物化学硕士研究生.

万方数据

前体生物合成, 苏氨酸、甘氨酸也可转化为丝氨酸^[1]。虽然 L-丝氨酸属非必需氨基酸, 但作为一种生化试剂, 在食品、饲料、医药、农业以及化妆品工业中广泛应用。但由于种种技术条件的限制, 其供应量远远小于市场需求, 价格一直居高不下^[2]。

丝氨酸的合成途径主要有蛋白质水解提取法、传统发酵法、酶法和化学合成法^[2], 传统发酵法又包括直接发酵法和添加前体物发酵法。由于 L-丝氨酸处于氨基酸代谢的中间位置, 参与许多生物物质(如甘氨酸、蛋氨酸、嘌呤等)的合成, 代谢运转速度极快。因此, 与其它类氨基酸相比, L-丝氨酸的直接发酵法生产十分困难, L-丝氨酸发酵法生产的研究报告主要集中在利用添加前体物发酵生产 L-丝氨酸。甘油酸盐(或酯)、甘油酸三甲内盐、甘氨酸被认为是合成 L-丝氨酸最有前景的前体物^[3]。

研究发现, 甲基营养型菌株, 尤其是通过丝氨酸途径来吸收甲醇的甲基营养型菌株能生产 L-丝氨酸^[4~6]。在此途径中, 甲醇在甲醇脱氢酶的作用下被氧化为甲醛, 甲醛再同四氢叶酸反应生成甲叉四氢叶酸, 在丝氨酸羟甲基转化酶(STHM)作用下, 甲叉四氢叶酸与甘氨酸反应生产 L-丝氨酸^[3]。

作者研究了产 L-丝氨酸菌株的分离、筛选及初步鉴定, 并对菌株利用甘氨酸发酵生产 L-丝氨酸的发酵条件进行了初步研究。

1 材料与方法

1.1 培养基

1.1.1 基本培养基 组分(g/L): $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 5, KH_2PO_4 1, $\text{K}_2\text{HPO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 3, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0.2, $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 0.002, $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0.002, 琼脂条 20, 生物素 50 $\mu\text{g/L}$, 硫胺素 $\cdot \text{HCl}$ 100 $\mu\text{g/L}$ 。

1.1.2 筛选培养基 I 50 mL 无菌甲醇, 其它成分同基本培养基。

1.1.3 筛选培养基 II 50 mL 无菌甲醇, 甘氨酸 5, 10, 20 g, 其它成分同基本培养基。

1.1.4 完全培养基 组分(g/L): 蛋白胨 10, NaCl 5, 甘氨酸 3, 酵母膏 5, 甲醇 10 mL。

1.1.5 种子培养基 组分(g/L): 葡萄糖 25, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 5, KH_2PO_4 1, 玉米浆 40, CaCO_3 10, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0.2 g。

1.1.6 发酵培养基 组分(g/L): 甘氨酸 0~30, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 20, KH_2PO_4 1, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0.2, 玉米浆 20, CaCO_3 20, 甲醇 0~40 mL。

基本培养基、筛选培养基、完全培养基和种子

培养基均以 20% NaOH 调至 pH 7.0~7.2, 0.1 MPa 压力下灭菌 20 min。发酵培养基以 20% NaOH 调至 pH 7.0~7.2, 0.07 MPa 压力下灭菌 10 min。

1.2 方法

1.2.1 菌种的分离及纯化 称取 5 g 土样(湿重), 加入到 0.85% 无菌生理盐水中, 取适当稀释度涂到筛选培养基 I, 于 30 °C 恒温箱中培养 5~7 d; 把生长快的单菌落转接到筛选培养基 II 上, 继续培养 3~5 d, 挑取生长快的菌株于完全培养基上, 30 °C 培养 24 h 后, 接种 1 mL 到含有 15 mL 无菌发酵培养基的 250 mL 三角瓶中, 置于 100 r/min、31 °C 的摇床上振荡培养 72 h, 测定发酵液中的 L-丝氨酸含量, 初筛出产 L-丝氨酸的菌株。

1.2.2 L-丝氨酸发酵 把筛出的菌株接种到含有 40 mL 无菌种子培养基的 250 mL 三角瓶中, 置于 100 r/min、31 °C 的摇床上振荡培养 12 h 后, 取 1 mL 接种到 15 mL 无菌发酵培养基的 250 mL 三角瓶中, 继续培养, 培养条件同初筛。

1.2.3 菌株鉴定方法 显微镜镜检(菌体形态)→革兰氏染色→生化特征试验^[7,8]

1.2.4 菌浓测定 吸取 0.2 mL 样品菌液到 5 mL 0.25 mol/L HCl 溶液中, 摇匀, 采用 721 分光光度计, 1 cm 光程 562 nm 下测定 OD 值。

1.2.5 pH 值测定 用精密 pH 试纸和酸度计测定。

1.2.6 L-丝氨酸定性、定量分析 采用纸层析方法^[9], 层析溶剂为 V(正丁醇): V(丙酮): V(二乙胺): V(水)=10:10:2:5。定量测定利用比色定量法^[9]及氨基酸自动分析仪。

2 结果与分析

2.1 L-丝氨酸产生菌的分离

利用筛选培养基 I, 从土壤中分离出 260 多株能利用甲醇的菌株, 它们全部是细菌, 经筛选培养基 II, 获得了 130 多株能抗甘氨酸的菌株, 它们均能在甘氨酸质量浓度为 5 g/L、甲醇体积分数为 50 mL/L 的培养基上生长, 而在甘氨酸质量浓度为 10 g/L、甲醇体积分数为 50 mL/L 的培养基上无菌株生长。经摇瓶初筛测定, 62 株明显产 L-丝氨酸。经复筛发现, 8 株产 L-丝氨酸较高, 分别编号为 A1—A8, 它们大部分形态是球形或杆状, 其中 A3 产 L-丝氨酸最好, 以下均利用该菌实验。

2.2 菌株 A3 的鉴定结果

菌株 A3 的分类学特性概括见表 1, 根据以上鉴定结果, 对照伯杰斯分类学手册, 初步鉴定该菌为

微球菌科(Micrococaceae).

表1 A3的分类学特性
Tab.1 Determination of strain A3

形态特征	培养特征	生理特性											
		葡萄糖试验	还原硝酸盐	甲基红试验	V.P.试验	硫化氢	水解淀粉	水解明胶	柠檬酸盐的利用	无机氮源的利用	生长温度	生长pH值	需氧情况
球形,1.0~1.5 μm,单个或成对,革兰氏阳性,不形成芽孢.	完全培养基平板上能生长,圆形,淡黄色,边缘光滑,凸起,光滑.	产气,产酸	阳	阳	阳	阴	阴	阳	稍利用	能利用铵盐,不能利用硝酸盐	10~38℃;最适温度:28~35℃	5~9;最适pH值6.5~7.5.	好氧

2.3 菌株 A3 L-丝氨酸发酵条件

2.3.1 不同质量浓度的甘氨酸对产酸的影响 当发酵培养基不添加甲醇时,测定不同质量浓度甘氨酸对 L-丝氨酸发酵的影响.从图1可以看出,当培养基中不添加或少量添加甘氨酸(质量浓度小于5 g/L)时,发酵液中无 L-丝氨酸积累,随着甘氨酸添加质量浓度的增加,发酵液中 L-丝氨酸的质量浓度也相应增加,在甘氨酸添加质量浓度达到30 g/L时,L-丝氨酸质量浓度达到最高值,为1.4 g/L.这说明要想获得高产量的 L-丝氨酸,发酵培养基中必须维持较高质量浓度的甘氨酸.从图1也发现,较高质量浓度的甘氨酸在一定程度上抑制菌体生长,而低质量浓度的菌体浓度不利于 L-丝氨酸的生产^[6],这是 L-丝氨酸发酵需要解决的问题.

图1 不同甘氨酸质量浓度对 L-丝氨酸生产的影响

Fig.1 Effect of the concentration of glycine on L-serine production

2.3.2 不同体积分数的甲醇对产酸的影响 从表2可知,在较高质量浓度的甘氨酸下,不添加甲醇有利于 L-丝氨酸的生产,增加甲醇不利于 L-丝氨酸的积累.低体积分数甲醇对菌体生长有促进作用,但影响不是很明显.高体积分数甲醇的添加不仅不利于菌体生长而且还不利于 L-丝氨酸的生产.当不添

加甘氨酸时,不管添加多少甲醇,菌体都无法合成 L-丝氨酸.这说明甘氨酸的添加是合成 L-丝氨酸必不可少的物质.

表2 不同体积分数的甲醇对 L-丝氨酸生产的影响

Tab.2 Effect of methanol on L-serine production

甲醇体积分数/(mL/L)	甘氨酸质量浓度/(g/L)	pH值	OD ₅₆₂	L-丝氨酸产量/(g/L)
0		8.08	0.478	0.61
5		7.89	0.470	0.23
10	20	7.86	0.492	—
20		7.86	0.470	—
40		7.95	0.380	—
5		7.04	0.083	—
10	0	7.14	0.112	—
20		7.16	0.142	—

2.3.3 初始 pH 值对产酸的影响 研究发现,初始 pH 值设定为 5.0,6.0,7.0,8.0,9.0 时对 L-丝氨酸的产量没有多大影响,这与一些资料报道的相同^[6].但较低或较高 pH 值对菌体生长有抑制,生长最佳 pH 值为 7.0~7.5.

2.3.4 添加不同碳源对产酸的影响 当发酵培养基无甲醇、甘氨酸质量浓度为 20 g/L 时,向培养基中分别添加不同碳源.碳源对 L-丝氨酸生产的影响见表3.

可以看出,添加葡萄糖、甘油、蔗糖、富马酸、乳糖、D-甘露糖有利于菌体生长,12 种碳源的添加对 L-丝氨酸的生产都不利.因此想通过添加外源碳源来提高菌体生长,同时提高 L-丝氨酸的产量在实验中并没有得到实现.

表 3 添加不同碳源对 L-丝氨酸生产的影响

Tab. 3 Effect of carbon sources on L-serine production

碳源	添加量/(g/L)	pH 值	OD ₅₆₂	L-丝氨酸产量/(g/L)
对照	0	0.432	8.18	0.67
	5	0.487	8.28	—
葡萄糖	10	0.571	8.30	—
	20	0.863	7.09	—
	40	0.950	5.93	—
山梨糖	5	0.170	7.83	—
蔗糖	5	0.526	8.26	—
棉子糖	5	0.418	8.20	—
D-甘露糖	5	0.528	8.23	0.32
可溶性淀粉	5	0.415	8.26	0.24
甘油	5	0.492	8.35	—
富马酸	5	0.508	8.41	—
柠檬酸	5	0.416	8.35	0.21
顺丁烯二酸	5	0.490	8.19	0.18
丙二酸	5	0.392	8.23	0.10
乳糖	5	0.468	8.08	—

注:“—”表示没有或产量太低无法测定。

2.3.5 不同氮源对产酸的影响 当发酵培养基无甲醇、甘氨酸质量浓度为 20 g/L 时,研究了 8 种不同氮源对产酸的影响,结果见表 4。可以看出,产酸最佳氮源为 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, 其次为 NH_4Cl , 其它 6 种氮源均不利于 L-丝氨酸的积累。

表 4 不同氮源(质量浓度为 0.1 g/L)对 L-丝氨酸生产的影响

Tab. 4 Effect of nitrogen sources on L-serine production

碳源	添加质量浓度/(g/L)	OD ₅₆₂	pH 值	L-丝氨酸产量/(g/L)
$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	30	0.339	7.59	0.78
KNO_3	48	0.319	9.16	—
NH_4Cl	25	0.332	7.06	0.45
$(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$	32	0.363	7.86	0.32
$(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$	31	0.362	7.95	0.28
尿素	14	0.285	8.25	—
$\text{CH}_3\text{COONH}_4$	36	0.141	7.10	—
$(\text{COONH}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	34	0.267	9.18	—

注:“—”表示没有或产量太低无法测定。

2.3.6 不同发酵时间对产酸的影响 当发酵培养基不添加甲醇且甘氨酸质量浓度为 20 g/L 时,不

同发酵时间对 L-丝氨酸发酵的影响见图 2。可以看出,在对数生长期末期,发酵液中 L-丝氨酸质量浓度达到最大值,然后会迅速降低。摇瓶最佳产酸时间为 72 h,当 L-丝氨酸产量较高时,发酵液中最终 pH 值在 8.0~8.5 之间。

图 2 不同发酵时间对 L-丝氨酸发酵的影响

Fig. 2 Effect of time on L-serine production

3 讨论

利用含 L-丝氨酸途径的甲基营养型菌株发酵生产 L-丝氨酸国外曾有许多报道^[4~6]。作者以甲醇为唯一碳源从土壤中分离出了 260 多株甲基营养型菌株,但只有 130 多株能在甘氨酸浓度为 5 g/L 的平板上生长,提高甘氨酸质量浓度到 10 g/L 时,它们均不长,说明甘氨酸对菌株的生长有很大的抑制作用。对产 L-丝氨酸较高的 8 株菌株进行 L-丝氨酸发酵实验,发现它们产酸最高达到 1.4 g/L,产量较低。

对产酸较好的菌株 A3 进行发酵条件初步研究发现,它可以在只以甘氨酸为唯一碳源的发酵培养基中积累 L-丝氨酸,添加低浓度的甲醇对菌体生长有促进作用,但影响并不是太大,提高甲醇的添加量不仅不利于菌体生长,而且也不利于 L-丝氨酸的生产。这说明该菌株可能不是利用 L-丝氨酸途径来生产 L-丝氨酸的。L-丝氨酸合成所需要的甲叉四氢叶酸可能来自于甘氨酸的分解^[3],同时甘氨酸分解会产生大量的 NH_3 ,这也是为什么利用甘氨酸发酵生产 L-丝氨酸发酵培养基 pH 普遍较高的原因。本实验中,培养基中维持较高浓度的甘氨酸对 L-丝氨酸生产是有利的,这同国外报道的结果相同^[10]。但这会带来两个方面的问题,即 L-丝氨酸对甘氨酸的转化率低和菌体生长不利。

L-丝氨酸在微生物体内代谢速率很快,菌体产生的 L-丝氨酸可能会立刻被菌体利用,因此如何降低 L-丝氨酸的降解将有待研究。(下转第 54 页)

图6 超声对酪蛋白与胰蛋白酶的荧光发射光谱的影响

Fig. 6 Spectrum of fluorescence emission of trypsin

参考文献:

- [1] Yusuf Chisti. Sonobioreactors; using ultrasound for enhanced microbial productivity[J]. **TRENDS in Biotechnology**, 2003, 21(2): 89-93.
- [2] Mason T J, L Paniwnyk J, P. Lorimer. The uses of ultrasound in food technology[J]. **Ultrasound Sonochemistry**, 1996, 3: 253-260.
- [3] 朱国辉, 黄卓烈. 功率超声对酶促反应的影响[J]. **应用声学**, 2001, 20(4): 45-48.
- [4] 周慧, 鲁治斌, 齐杰, 等. 蛋白质水解酶活力测定新方法[J]. **生物化学杂志**, 1994, 10(5): 630.
- [5] 黄卓烈, 林茹, 何平, 等. 超声波对酵母过氧化氢酶及多酚氧化酶活性的影响[J]. **中国生物工程杂志**, 2003, 23(4): 89-93.
- [6] Sakakibara M, Wang D, Takahashi R, *et al.* Influence of ultrasound irradiation on hydrolysis of sucrose catalyzed by invertase[J]. **Enzyme Microb Technol**, 1996, 18: 444-448.
- [7] 高大维, 陈满香. 超声波催化糖化酶水解淀粉的初步研究[J]. **华南理工大学学报(自然科学版)**, 1994, 22(1): 70-74.
- [8] Masanao Imai, Kohei Ikari, Isao Suzuki. High-performance hydrolysis of cellulose using mixed cellulase species and ultrasonication pretreatment[J]. **Biochemical Engineering Journal**, 2004, 17: 79-83.
- [9] 丘泰球, 刘石生. 声场对蛋白酶催化活力及分子构象的影响[J]. **声学技术**, 2000, 4: 233-235. (责任编辑: 杨萌)

(上接第49页)

参考文献:

- [1] 冯美卿, 曹秀格, 卢永辉. L-丝氨酸制备方法评述[J]. **氨基酸和生物资源**, 2000, 22(3): 42-44.
- [2] 傅莉, 刘信洪, 徐春艳, 等. HPLC法监测DL-丝氨酸的合成研究[J]. **北京化工大学学报(自然科学版)**, 2003, 30(4): 105-108.
- [3] 张炳荣. 氨基酸生产技术讲座[J]. **中国调味品**, 1986, (10)22: 28-32.
- [4] Hideaki Yamada, Silvia Susana Miyazaki. L-Serine production by a glycine-resistant mutant of methylotrophic *Hyphomicrobium metylovorum*[J]. **Agric Biol Chem**, 1986, 50(1): 17-21.
- [5] Yasushi Morinaga, Shigeru Yamada, Koichi Takinami. L-Serine Production by methanol-utilizing bacterium *Pseudomonas* MS31[J]. **Agric Biol Chem**, 1981, 45(6): 1419-1424.
- [6] Yoshiki Tani, Takahiro Kanagawa. Production of L-Serine by a methanol-utilizing bacterium, *Arthrobacter globiformis* SK-200[J]. **Agric Biol Chem**, 1978, 42(12): 2275-2278.
- [7] 范秀容, 沈萍. 微生物学实验[M]. 北京: 人民教育出版社, 1980.
- [8] R. E. 布坎南, N. E. 吉本斯. 伯杰细菌鉴定手册[M]. 北京: 科学出版社, 1984.
- [9] 潘家秀, 任梅轩, 徐俊杰, 等. 蛋白质化学研究技术[M]. 北京: 科学出版社, 1962.
- [10] Behrendt U, Bang W G, Wagner F, *et al.* The production of L-serine with a methylotrophic microorganism using the L-serine pathway and coupling with an L-tryptophan-producing process[J]. **Biotechnology and Bioengineering**, 1984, 26: 308-314.