文章编号:1673-1689(2006)06-0037-05

黄曲霉毒素 B₁ 金标检测体系建立过程中的影响因素

孙秀兰¹, 张银志², 汤坚², 赵晓联³

(1. 江南大学食品学院, 江苏无锡 214036; 2. 江南大学分析测试中心, 江苏无锡 214036; 3. 江苏省微生物研究所有限公司, 江苏无锡 214038)

摘要: 详细研究了纳米金标记免疫检测体系建立过程中的影响因素, 包括检测带的信号强度、封闭试剂, 纳米金探针的浓度、包被试剂 A 和 B 的浓度、纳米金溶胶的颗粒尺寸, 及检测过程中的化学体系等。通过参数优化, 确立了建立快速、简易的金标试剂条检测方法的最佳条件。探针溶液中加入保护试剂 K 后, 试剂条的稳定性有明显的提高, 常温下试剂条保存期可达 120 d (信噪比保留 70% 以上)。

关键词: 黄曲霉毒素 B₁; 纳米金; 免疫层析; 试剂条

中图分类号: TS 201.6

文献标识码: A

Study on Factors Influencing on the Development of Nanogold-Labeled Assay System of Aflatoxin B₁ in Foods

SUN Xiu-lan¹, ZHANG Yin-zhi², TANG Jian², ZHAO Xiao-lian³

(1. School of Food Science and Technology, Southern Yangtze University, Wuxi 214036, China; 2. Testing & Analysis Center, Southern Yangtze University, Wuxi 214036, China; 3. Microbiology Company Jiangsu Province, Wuxi 214038, China)

Abstract: Effect of the detection line signal, the blocking reagent, the colloidal gold-labelled probe concentration, the coating reagent A and B concentration, the nanogold size and the chemical system on the development of nanogold-labeled immunochromatographic strip (GICA) for analysis aflatoxin B₁ was investigated. The results showed that, the analysis time of aflatoxin B₁ only 10 min with the optimal conditions.

Key words: Aflatoxin B₁; nano-gold; Immunochromatographic; Strip

自从 AFB₁ 被发现以来, 为了降低 AFB₁ 对人类和动物的危害, 世界许多国家都开展了食品和饲料中 AFB₁ 的检测方法的研究, 其中有些方法已经被 AOAC 所采纳^[1-3]。常用的化学方法主要包括薄层色谱法 (TLC) 和液相色谱法 (HPLC), 常用的免疫分析方法为酶联免疫吸附法 (ELISA)^[3-4]。传统

的 TLC 方法也是我国国标检测中的第一法, 一直是检测部门普遍使用的方法。但是, TLC 方法的检测灵敏度很低, 操作人员暴露于有潜在危害的有机溶剂威胁中, 而且要与高浓度毒素标准品直接接触, 存在明显的安全隐患。而 ELISA 和 HPLC 方法虽然提供了良好的敏感度, 但是分析过程繁琐,

收稿日期: 2006-04-30; 修回日期: 2006-07-20.

基金项目: 江苏省自然科学基金项目 (BK2002406).

作者简介: 孙秀兰 (1976-), 女, 山东聊城人, 副教授.

检测时间较长,必须借助分析仪器,不能适应现场快速检测的要求^[5-6]。新型检测技术——金标免疫层析(Gold Labeled Immunochromatographic Assay,简称GICA)是20世纪80年代初发展起来的一种快速免疫诊断技术^[7]。利用纳米金作为标记物,短时间(15 min)之内便可得到直观的结果。它不需进行结合标记物与自由标记物的分离,省去了繁琐的加样、洗涤步骤,不仅提高了检测速度,而且检测过程中无需处理试剂,真正实现了一步法(One-step)检测。该方法操作简单快速,人员只需短期简单培训,非常适合现场检测的要求,亦适用于家庭中食物安全的自我监测(Point-of-care)。文中将根据免疫层析的原理,建立AFB₁快速金标检测方法,并对其进行方法学评价。

1 材料与方 法

1.1 实验材料

包被A试剂为黄曲霉毒素B₁抗原,包被B为黄曲霉毒素B₁二抗,A试剂、B试剂和金标探针均为作者所在实验室自制;纤维膜、金标垫、样品吸收垫、吸水纸购自Dassel公司;AFB₁标准溶液(溶于甲醇)购自Sigma公司;大米、玉米、花生、花生油和饲料样品,采集自陕、桂、鄂、赣的有关粮库或加工厂;实验用水均为去离子水。

1.2 实验仪器

XYZ 3000型金标点样仪,CA92614型金标切条机,SR3000型金标试条扫描仪,美国Bio-dot公司制造;TK型微量移液器,芬兰雷勃公司制造;小型粉碎机,MS2型微量振荡器,德国IKA公司制造;HH-S型恒温水浴锅,金坛国盛实验仪器厂制造;隔水式电热恒温培养箱,上海跃进医疗器械厂制造;pH计,上海梅特勒-克利多公司制造;SK250LH型超声波清洗器,上海科导仪器公司制造。

1.3 实验方法

1.3.1 GICA检测技术的建立 测试条由样品垫、金标垫、硝酸纤维膜(NC膜)和样品吸收垫4个部分组成。将制备好的金标抗体稀释后分散在玻璃纤维滤膜上,自然干燥后备用。将硝酸纤维素膜活化处理后,用自动点样仪对硝酸纤维膜进行检测试剂线性包被,下端横线包被A试剂,质量浓度100 μg/mL为检测线;上端横线包被B试剂,质量浓度为2.0 mg/mL。自然干燥后用0.1 mol/L的BSA的PBS溶液(pH 7.4)浸泡30 min进行封闭处理,干燥后备用。将4个部分依次相互叠加粘贴于试

剂板上,以宽3.5 mm/条切条后备用。

1.3.2 AFB₁标准溶液的检测 用甲醇将AFB₁配制成10.0 mg/mL的溶液,再用甲醇-PBS溶液(20+80)稀释至约10 μg/mL,紫外分光光度计测定溶液(361 nm波长)的光密度值,代入下式计算:

$$X = A \times M \times 1000 \times f / E$$

式中: X 为该溶液中AFB₁的质量浓度,μg/mL; A 为测得的光密度值; M 为AFB₁的相对分子质量,312; E 为摩尔消光系数,21 800; f 为使用仪器的校正因素。根据计算将该溶液配制成10 μg/mL的标准溶液,检测时,用甲醇-PBS溶液将该标准溶液稀释至所需质量浓度(0.05、0.1、0.5、1、2、5、10 ng/mL)或质量分数(0.05、0.1、0.5、1、2、5、10 μg/kg)。分别将不同质量浓度的AFB₁标准溶液滴加于微孔中,将测试条垂直插入微孔,5~10 min左右目测检测结果。

1.3.3 抑制率的测定 通过测试条扫描仪检测信号强度,将颜色信号通过试剂条光度计,即可转变为光密度值进行定量检测。

$$F = \frac{A_i}{A_0} \times 100\%$$

式中: F 为抑制率; A_i 为样品检测的信号强度的OD值, A_0 为AFB质量浓度为0时的信号强度的OD值。

1.3.4 食品样品的检测

1) 样品采集:本实验所做样品有大米、玉米、小麦粉和饲料。根据国家取样暂行标准,从陕西、广西、湖北、湖南、江西省有关粮库和食品加工厂采集。

2) 样品提取与纯化:参照国标中ELISA测定方法中的样品提取。固体样品(大米、玉米和花生)粉碎后,过20目筛,充分混合,按四分法取20 g于250 mL的磨口三角瓶中,准确加入100 mL甲醇-水(体积比55:45)溶液,振荡15 min,过滤,弃去初滤液。准确吸取20 mL滤液(相当于4 g样品)于250 mL的分液漏斗中,加入80 mL氯仿,加塞振摇5 min,静置分层(约30 min),放出下层氯仿层,经盛有约20 g预先用氯仿湿润的无水Na₂SO₄定量,慢速滤纸漏斗过滤于100 mL的蒸发皿中,再加入10 mL氯仿于分液漏斗中,重复振摇提取,氯仿一并滤于蒸发皿中,最后用少量氯仿洗涤过滤漏斗,洗液并入蒸发皿中。将蒸发皿放入通风橱,于65℃水浴上通风挥干后,冷却。准确加入20 mL甲醇-PBS(体积比1:1)溶液,充分溶解凝结物,即为待测样品提取液。

2 结果与讨论

2.1 GICA 检测带的信号强度

溶解有金标探针的检测缓冲液在向上迁移产生检测信号的过程中,不可避免地吸附在 NC 膜上,使得检测区之外的部分也产生了红色印记,这就产生了检测的背景值。检测液体积一定的情况下,信号值和背景值主要是由探针的浓度和膜上包被试剂 A 的浓度所决定。通过改变二者的浓度配比,可以筛选和优化最佳信号强度产生的条件。实验中首先保证检测液体积(100 μL)不变,改变金标垫上的纳米金探针的稀释倍数,结果如图 1 所示。可知,随着探针稀释度升高,信号值和背景值降低,而信噪比却呈升高的趋势。因为提高探针的稀释度,使得金溶胶浓度降低,而使得信号和背景值降低,背景值降低的幅度大于信号值。该结果与其它免疫分析方法中的经验结果相一致,标记探针的稀释度越大,背景值就越大幅度降低,所得到检测信号的敏感度增强,而且研究过程中也发现,探针浓度过高使得检测液的层析速度降低。考虑到金溶胶浓度过低,其产生的颜色信号太浅不易识别,所以,选择探针喷布于金标垫前的工作浓度为 1:500。

图 1 抗体探针的稀释度对信号强度的影响

Fig. 1 Effect of gold-labeled probe dilution times on signal

研究了包被试剂 A 的浓度对检测信号带强度的影响,结果如图 2 所示。可以看出,随着包被试剂 A 浓度升高,检测带的信号值增大,但同时背景值也增大。信噪比先增加后又微弱降低的趋势,说明试剂 A 浓度过高能引起信号强度下降,选择试剂 A 包被质量浓度范围为 50~200 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 均可使信号与噪音之比达到 3 左右,其中试剂 A 质量浓度为 100 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 为最适合包被的试剂 A 质量浓度。

图 2 包被试剂 A 浓度对检测带信号强度的影响

Fig. 2 Effect of immobilized antigen concentration on the signal

NC 膜对生物分子的非特异性吸附,是背景值产生的重要原因。对膜其它区域进行蛋白质分子封闭的办法可以降低这种影响。实验中选取了浓度为 0.1 mol/L 的 BSA 溶液和脱脂奶粉溶液进行封闭,封闭前后检测区信号强度的变化如图 3 所示。可知,封闭后信号值和背景值都降低,背景值的降低幅度明显大于信号值,信噪比增加。BSA 溶液的封闭效果明显优于脱脂奶粉。

图 3 封闭对信号光密度值的影响

Fig. 3 Effect of blocking on signal by BSA and nonfat milk

2.2 GICA 检测过程中的化学体系

试剂 A 和金标探针复合物的形成受到检测体系化学环境的影响,可以通过优化检测体系的化学环境而加强,如分析试剂的酸度、离子强度和有机溶剂的含量等^[8]。合适的缓冲体系可以加强信号的产生。研究证明,该分析体系的离子浓度调整到最小(即 0.01 mol/L)和溶液的酸度为 pH 7.4 是最适的缓冲液离子条件。

黄曲霉毒素易溶于甲醇、氯仿和丙酮等有机溶

剂中,其中甲醇对反应的影响最小,是在 AFB₁ 免疫分析中主要使用的检测试剂^[5-6]。对不含 AFB₁ 的样品缓冲液体系磷酸盐缓冲液(PBS,pH 为 7.4)中甲醇体积分数对信号的影响进行了研究,结果如图 4 所示。可知,随着缓冲体系中甲醇体积分数的升高,信号和噪音的光密度强度均增加,而信噪比却逐渐降低。实验结果说明,样品缓冲体系中甲醇与 PBS 的最适体积比例为 1:9。在这个水平上,即体积分数 10% 甲醇的信噪比与 PBS 无明显差异。

图 4 甲醇体积分数对信号强度的影响

Fig. 4 Effect of methanol in test solution on signal generated in GICA-strip for AFB₁ analysis

2.3 标记探针中金溶胶粒径大小对信号强度的影响

对不同大小颗粒的金标探针进行信号产生的研究,结果如图 5 所示。可知,在一定范围内,随着金颗粒增大,信号强度增加。但是超过一定粒径后,背景增加的幅度大于信号值,所以标记探针中金溶胶最佳颗粒尺寸为 25~30 nm。原因可能是因为颗粒越大,对抗体蛋白质的吸附能力降低,致使探针稳定性降低,所以非特异性吸附增加。实验中选择平均直径为 25 nm 的金溶胶标记探针为检测探针。

2.4 GICA 方法定量或半定量分析的方法学评价

2.4.1 检测时间与目测结果 将 AFB₁ 标准溶液(缓冲液体系为甲醇/PBS,体积比 1:9 溶液)进行免疫层析试条测定。整个检测分析过程在 10 min 内即可完成。在缓冲液中没有 AFB₁ 时,在检测区产生信号强的深红色带。相反,当检测溶液中 AFB₁ 质量分数高于 1.0 μg/kg 时,检测带的信号几乎消失。在检测加标浓度(质量分数)为 1.0 μg/kg 的大米提取液时,检测带的信号也呈现消失的状态。

图 5 金颗粒粒径对信号强度的影响

Fig. 5 Effect of colloidal gold particle size on signal

2.4.2 精密度 在 GICA 检测范围 0.01~20 μg/kg,进行试剂条的精密度实验,重复次数为 10,计算抑制率的平均值、标准偏差和变异系数。见表 1,在 0.01~20 μg/kg 范围内测定结果的变异系数均小于 10.0%,平均值为 7.43%。

表 1 GICA 测定结果的重复性

Tab. 1 Results of assay reproducibility

AFB ₁ 质量分数/ (μg/kg)	平均 抑制率/%	SD	变异系数/%
0.01	94.99	4.98	5.24
0.05	80.6	6.54	8.11
0.1	70.24	4.66	6.63
0.2	53.54	4.49	8.39
0.5	37.41	2.82	7.54
1.0	24.54	2.26	9.21
2.5	18.91	1.02	5.39
5.0	16.22	1.18	7.27
10.0	13.06	0.9	6.89
20	9.99	0.96	9.61

2.4.3 稳定性 GICA 试剂条的稳定性主要是由金标探针的稳定性决定的。作为一种高分子蛋白质和金纳米颗粒的复合物,抗体探针分子很容易发生热变性,导致探针失活。所以,选择合适的抗体探针稳定剂,有效保护探针的活性,对提高 GICA 检测方法的稳定性,延长试剂条的货架期起到非常关键的作用。分别在常温、37 °C、56 °C 下做 GICA 试剂条的稳定性实验。结果表明,探针溶液中加入 10% (体积分数) 保护试剂 K (3% 的 NaCl 溶液) 后,试剂条的稳定性有明显的提高,常温下试剂条保存

期可达 120 d(信噪比保留 70%以上)。图 6 显示的是 GICA 检测试剂条的信号强度随热处理(56 °C)时间的变化。加入保护剂后,在高温(56 °C)放置 20 d 抗体探针的信号强度仍可保留 70%以上,而对照放置 10 d,信号强度降低至 40%以下。

3 结 论

1) 研究建立了一种快速、简易的检测食品中 AFB₁ 的纳米金标免疫层析检测方法。在进行测定时无需分离步骤,不需加入任何试剂,方法简便快捷,10 min 内即可得到结果。利用金溶胶产生的信号颜色深浅,可进行定性或定量检测。

2) 当检测质量分数为 1.0 μg/kg AFB₁ 的标准溶液时,检测带的信号差异非常明显,检测时间为 10 min 之内。方法的稳定性良好,试剂条常温保存期为 120 d。

参考文献:

- [1] Richard J L, Payne G A. Mycotoxins: risks in plant, animal and humans[M]. Iowa: Council of Agricultural Science and Technology(CAST), 2003: 139-199.
- [2] Chu Fan-shen. Mycotoxins[M]. NY: Academic Press, 2002.
- [3] Chu Fan-shen, Bhatnagar D. Mycotoxins[M]. Basel: Marcel Dekker, 2004: 325-342.
- [4] Horwitz W. Official Methods of Analysis of AOAC International[M]. [S. l.]: AOAC International, 2000.
- [5] Gilbert J. Overview of mycotoxin methods, present status and future needs[J]. *Nat. Toxins*, 1999, 7: 347-352.
- [6] Chu Fan-shen. Immunochemical methods for mycotoxin analysis: from radioimmunoassay to biosensors[J]. *Mycotoxins*, 2004, 54: 1-14.
- [7] Paek S H, Lee C W, Yook S H, et al. Performance control strategies of one-step immuno-chromatographic assay system for *Salmonella typhimurium*[J]. *Anal Lett*, 1999, 32: 335-360.
- [8] Horton J K, Swinburne S, Sullivan M J. A novel, rapid, single-step immunochromatographic procedure for the detection of mouse immunoglobulin[J]. *J Immuno Method*, 1991, 140: 131-134.
- [9] Richard J, Cole Joe W. Dorner. Extraction of aflatoxin from naturally contaminated peanuts and solvent/peanut rations [J]. *J AOAC*, 1994, 77(6): 1509-1511.
- [10] 袁易全, 陈思忠. 近代超声原理与应用[M]. 南京: 南京大学出版社, 1996: 134.
- [11] 赵晓联, 赵春城, 陆茂林, 等. 酶联免疫吸附法测定黄曲霉毒素 B₁ 误差分析[J]. 中国卫生检验杂志, 2001(11): 87-93.

(责任编辑: 秦和平, 杨萌)

(上接第 36 页)

参考文献:

- [1] 陈红漫, 祝令香, 董志杨. 酿酒酵母海藻糖-6-磷酸合成酶基因克隆及植物表达载体的构建[J]. 微生物学报, 2001, 41(1): 409-411.
- [2] 张红缨. 海藻糖生物合成和相关的酶学特性[J]. 微生物学通报, 1998, 25(4): 236-238.
- [3] 陈炜, 何秉旺. 酶法合成海藻糖研究的新进展[J]. 微生物学通报, 1998, 25(3): 164-166.
- [4] Roser B. Trehalosedrying-a novel replacement for freeze drying[J]. *Biopharm*, 1991, 4(8): 47-53.
- [5] 曾国驱. 海藻糖产生菌筛选及其发酵条件的研究[J]. 生物技术, 2002, 12(3): 28-31.
- [6] 荣绍丰. 一株转化淀粉或麦芽糖寡糖生成海藻糖的菌株 D-97 的鉴定[J]. 微生物学通报, 2003, 30(2): 57-60.

(责任编辑: 李春丽)

图 6 金标免疫层析试剂条的热稳定性(56 °C)
Fig. 6 Thermal stability of the immunochromatographic strip(56 °C)