文章编号:1673-1689(2007)05-0099-05

黄曲霉毒素 B₁ 完全抗原构建中结合位点研究

孙秀兰¹, 张银志², 汤坚², 朱瑜³

(1. 江南大学食品学院, 江苏无锡 214122; 2. 江南大学分析测试中心, 江苏无锡 214122; 3. 陕西省汉中市质检所, 陕西汉中 724000)

摘要: 通过衍生生化反应, 合成了 AFB₁ 羧甲基活化物, 然后利用碳二亚胺法合成 AFB₁-O-BSA 偶联物, 构建 AFB₁ 完全抗原, 并通过多种光谱和质谱对合成完全抗原过程中偶联比和结合位点进行研究。通过荧光光谱在分子水平上探讨 AFB₁ 与 BSA 载体蛋白的偶联机制及偶联反应对 BSA 的构象影响, 推测黄曲霉毒素和牛血清白蛋白反应的结合部位, 同时发生在 BSA 的酪氨酸残基和色氨酸残基上, 使得 BSA 疏水性增加, 肽链伸展程度降低。

关键词: 黄曲霉毒素 B₁; 完全抗原构建; 结合位点

中图分类号: Q 949.327.1

文献标识码: A

Study on the Binding Site in the Construction of AFB₁ Complete Antigen

SUN Xiu-lan¹, ZHANG Yin-zhi², TANG Jian², ZHU Yu³

(1. School of Food Science and Technology, Jiangnan University, Wuxi 214122, China; 2. Testing and Analysis Center, Jiangnan University, Wuxi 214122, China; 3. Hanzhong Quality Supervision and Inspection Bureau, Hanzhong 724000, China)

Abstract: To study the coupling ratio and the binding site of AFB₁ and BSA during the construction of the AFB₁ complete antigen, AFB₁-carboxymethyl and AFB₁-O-BSA complexation were synthesized by carbodiimide method. Different kind of spectroscopy and mass spectra methods was employed. The mechanism of the coupling and the effects to the structure of the BSA were investigated in the molecular level. The results showed that the binding sites of the AFB₁ and BSA were both situated in the Tyr and Trp residue of the BSA. The binding made the increasing of the hydrophobicity of the BSA and the decreasing of the extension of the peptide chain.

Key words: aflatoxin B₁; immuno-antigen; conjugation location

半抗原(hapten)是指不含蛋白质成分的有机小分子,它可以和抗体反应,但是不能诱发机体产生免疫应答,即有免疫反应性,而无免疫原性^[1-2]。为了得到半抗原的特异性抗体,首先必须将半抗原与某一特定结构的生物大分子结合,形成完全抗原,这种生物大分子被称为载体。抗体的特异性决定于完全抗原中半抗原分子决定簇,而载体蛋白分子决定了宿主对半抗原免疫应答的性质和量^[3]。黄曲霉毒素 B₁(AFB₁)是小分子的有机化合物,相对

分子量仅为 312.04,是一种典型的半抗原。作者以 BSA 为载体蛋白,用 EDC 法合成 AFB₁ 完全抗原,对其进行结构鉴定和构象分析,研究其结合过程中位点的连结情况,为建立快速准确检测 AFB₁ 的免疫学方法提供研究基础。

1 材料与方法

1.1 实验材料

AFB₁, AFB₂, AFG₁, AFG₂, 羧甲基羟胺半盐

收稿日期:2006-06-13.

作者简介:孙秀兰(1976-),女,山东聊城人,副教授,工学博士,主要从事食品安全检测研究. Email: sxlzxx@yahoo.com.cn

酸盐,碳二亚胺盐酸盐(EDC),福氏完全佐剂和不完全佐剂:Sigma公司产品;牛血清白蛋白(BSA)、鸡卵清蛋白(OVA);华美公司产品;四氢呋喃、吡啶、二甲基甲酰胺、甲醇、氯仿、碳酸氢钠:分析纯试剂。

1.2 实验仪器

紫外可见分光光度计: Spectronic 1.70 GBC; 傅立叶红外光谱仪: Win-IR Bio-Rad 产品; 酶标仪: MK3 Labsystems Dragon Wellscan; ESI质谱仪: Waters Platform ZMD 4000, Waters 公司产品; 电泳设备: DYY-38, 北京六一仪器厂产品; 荧光光谱仪: RF-5301PC, 日本岛津公司产品; 旋转蒸发仪: WBG 1-4002; 磁力搅拌器: RCT IKA; 薄层扫描仪: CAMAG TLC SCANNER 3, 瑞士卡玛公司产品。

1.3 实验方法

1.3.1 AFB₁的活化 根据Morgan报道的方法并加以改进^[4-8]。

(1) 10 mg AFB₁溶于6 mL(V(甲醇):V(水):V(吡啶)=4:1:1)混合液中,加入20 mg 羧甲基羟胺半盐酸盐,85 °C回流3 h,室温放置过夜,旋转蒸发仪减压蒸除溶剂。

(2) 所得沉淀物用少量氯仿溶解,以V(氯仿):V(甲醇)=9:1为展开剂,与标准AFB₁的展开值R_f进行对照,R_f值为0.25左右的是AFB₁的活化物,R_f值为0.75左右的组份是没有转化的AFB₁,收集活化物组份,待第二次薄层层析进行纯化。

(3) 收集AFB₁活化物,用少量的甲醇溶解,待用。

1.3.2 AFB₁完全抗原的合成

(1) 取AFB₁活化物5 mg于5 mL的磨口烧瓶中,加5 mL无水二甲基甲酰胺(DMF)溶液使其溶解,置4 °C冰箱中冷却。取50 mg 碳二亚胺盐酸盐(EDC)溶于1.0 mL蒸馏水中,取44 mg BSA溶于

4.0 mL 0.01 mol/L 磷酸缓冲液(PBS,pH 7.4)中,冰箱中冷却待用^[7-10]。

(2) 在磁力搅拌的同时,将0.5 mL EDC溶液逐滴加入AFB₁溶液中,4 °C搅拌,避光反应1 h。在反应液中缓慢滴加BSA溶液,继续搅拌反应1 h后,再加入0.5 mL EDPC溶液,4 °C下反应16 h。

(3) 将产物溶液用0.01 mol/L PBS溶液在4 °C下透析72 h,每12 h换透析液一次,用小瓶分装,真空冷冻干燥后,置4 °C保存。用相同的方法将AFB₁-羧基化合物与OVA进行偶联合成AFB₁-OVA偶联抗原。

1.3.3 AFB₁多抗血清的免疫反应性 为了验证完全抗原的免疫原性,作者选择健康的雄性新西兰大白兔为免疫动物,检测了所产生抗体的反应特异性。结果说明:所构建的完全抗原具有很好的刺激动物产生抗体的能力^[11],免疫12周抗体效价达到25 600左右。作者以AFB₁及其结构类似物,黄曲霉毒素B₂(AFB₂)、黄曲霉毒素G₁(AFG₁)、黄曲霉毒素G₂(AFG₂)作为竞争抗原,研究了它们对获得的抗血清的竞争抑制反应性。结果显示,获得的抗血清对AFB₁的竞争抑制性最强,抑制率为100%,对AFB₂, AFG₁, AFG₂竞争抑制性依次降低。3种结构类似物的交叉反应率分别为:AFB₂ 28%, AFG₁ 27%, AFG₂ 11%。该结果也证实了制备的完全抗原具有很好的免疫原性。

2 结果与讨论

2.1 AFB₁完全抗原的构建原理

由于AFB₁本身的性质不活泼,不具有能和蛋白质连接的活性基团,因此首先要通过适当的衍生化方法,将活性基团引入AFB₁中。制备AFB₁完全抗原的反应路线如图1所示。

图1 AFB₁-BSA完全抗原的合成路线

Fig. 1 The synthesis path of AFB₁-BSA complete antigen

首先是引入活性基团羧基。半抗原分子中与载体蛋白结合的位点的选择将影响到抗体免疫特异性, 选择半抗原结构类似物分子上共有基团作为偶联位点时, 免疫动物产生的抗体具有较好的特异性。因此, 作者选择 AFB₁ 分子中环戊酮环上 C₃ 位作为活化位点, 将 C₃ 位的羰基转化为 N-O-甲基羧酸。沿用甾族化合物羧基化反应的方法, 以吡啶为催化剂, AFB₁ 在甲醇水溶液中, 通过加热回流, AFB₁ 转化为 AFB₁ 羧基活化物。然后 AFB₁ 羧基活化物与蛋白合成的催化剂碳二亚胺 (EDC) 作用形成复合物, 复合物是极不稳定的中间产物, 中间产物分解, AFB₁ 的羧基迅速与载体蛋白 BSA 的氨基发生羧胺反应, 形成稳定的偶联产物。

2.2 AFB₁ 羧基活化物的结构鉴定

AFB₁ 活化后化学组成为 C₁₉H₁₅NO₈, 分子的特征基团 (呋喃环和香豆素结构) 未发生显著改变。图 2 分别显示的是 AFB₁ 和 AFB₁ 羧基活化物 (AFB₁-Oxime, 简称为 AFB₁-O) 的薄层色谱的鉴定结果。展开溶剂系统为 V(甲醇): V(氯仿) = 1: 9, 展开距离为 15 cm, 检测波长为 361 nm。由图 2 可知, AFB₁ 分子经活化后, 展开距离大大降低, R_f 为 0.25, AFB₁ 为 0.78。将层析分离纯化的 AFB₁-O 进行紫外吸收光谱分析 (见图 3)。在甲醇溶剂中, AFB₁-O 有 4 个吸收峰分别是 209 nm, 223 nm, 265 nm 和 361 nm, 与 AFB₁ 特征吸收峰基本一致。

1. AFB₁; 2. AFB₁-O

图 2 AFB₁-O 的薄层层析图谱

Fig. 2 Photo of TLC of AFB₁-O

图 3 AFB₁-O 的紫外吸收图谱

Fig. 3 UV spectra of AFB₁-O

图 4 显示的是 AFB₁ 羧基活化物的电喷雾质谱图。m/z 408.4 是 AFB₁ 羧基活化物的准分子离子峰, [AFB₁-O+Na]⁺, 由此算出, 活化物的相对分子质量为 385.4, 与应得产物 C₁₇H₁₂O₆ 的相对分子质量基本一致。m/e 334.6 为 AFB₁ 羧基活化物分子断裂而成的碎片峰, [AFB₁+Na]⁺, 与 AFB₁ 的相对分子质量相一致。综合 TLC 和 MS 的分析结果, 可以初步断定活化产物即是 AFB₁ 羧基化合物。根据 AFB₁-O 在 361 nm 处的 A 值及摩尔消光系数 20 950, 计算活化产物 AFB₁-O 的产量为 8.36 mg, 产率为 83.6%。

2.3 AFB₁-O-BSA 偶联物的纯化和结构鉴定

为了鉴定偶联产物的纯度, 在透析结束后进行了 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳实验。结果显示, 纯化所得的产物呈现一条谱带, 与 BSA 相比, 该条带出现的位置相同, 说明经纯化后的偶联产物达到一定纯度要求, 可以进行系列的结构鉴定。

BSA 是一种典型的血清蛋白, 在 280 nm 具有特征吸收峰, AFB₁-O 在 361 nm 具有特征吸收峰。对合成的偶联物进行紫外光谱分析, 结果如图 5 所示。偶联物在 280 nm 和 361 nm 处同时表现出了明显的吸收峰, 而且由于两者之间的迭加效应, 吸收峰的位置有轻微的位移。由此, 可初步判断, AFB₁-O 和 BSA 已经偶联上了。

图 4 AFB₁-O 的质谱图

Fig. 4 The ESI Mass spectrum

图5 AFB₁-O-BSA 偶联物的紫外光谱

Fig. 5 UV spectra of AFB₁-O-BSA

图6显示的是 AFB₁-O-BSA 偶联物与 BSA 的红外光谱图。由图看出,两者之间存在显著差异。BSA 的红外光谱显示了蛋白质所共有的谱带,酰胺有二个特征吸收称为 I 带、II 带,其中 I 带位于 1 640 cm⁻¹ 的为酰胺中羰基的伸缩振动所产生; II 带位于 1 550 cm⁻¹,属 N-H 弯曲。AFB₁-O-BSA 偶联物的红外光谱图基本显示出 BSA 的特征吸收谱带,但是与 BSA 相比,偶联物在 1 156 cm⁻¹ 和 1 073 cm⁻¹ 显示出明显吸收峰。因为偶联物中 BSA 本身的酰胺谱带非常明显,所以无法从反应生成的新的酰胺键来判断。而 AFB₁-O 结构中有些特征基团如 1 735 cm⁻¹ 的戊酮、1 630 cm⁻¹ 的 C=N 键等,也由于受 BSA 吸收峰的影响表现并不明显。但在 1 100 cm⁻¹ 附近仍可显示明显的 AFB₁-O 结构中的 C-O-C 键宽带吸收峰。结合紫外光谱分析,可以认为,AFB₁-O 与 BSA 确已发生了偶联反应。

1. BSA; 2. AFB₁-O-BSA

图6 AFB₁-O-BSA 偶联物红外光谱

Fig. 6 IR-Spectrum of AFB₁-O-BSA

2.4 AFB₁-O-BSA 偶联物的荧光光谱分析

BSA 作为一种载体蛋白决定了 AFB₁ 在动物体内的免疫应答的效应。载体蛋白的这种特异性主要反映在它本身的结构特性,只有具有特定组成和特定构象的物质才有诱导免疫应答的作用。虽然前面的研究结果已经证明 AFB₁ 确已与 BSA 发生了偶联反应,但是对于偶联反应的结合部位和偶联

前后 BSA 蛋白质的构象变化尚不清楚。

BSA 因为色氨酸和酪氨酸的存在使其具有较强的内源荧光^[11,12]。而 AFB₁-O 具有共轭基团,也具有一定的内源荧光。图7显示的是相同浓度的 BSA 和 AFB₁-O-BSA 的荧光发射光谱(a)和同步荧光光谱(b)。由图7(a)可知,AFB₁-O-BSA 与 BSA 发生反应后可引起 BSA 的荧光性质发生改变,首先表现在,BSA 蛋白质的内源荧光被淬灭,其次是荧光发射谱带发生改变。在 280 nm 作为激发波长时,BSA 荧光发射峰分别在 341,561,671,840 nm,荧光强度很大。发生偶联后,AFB₁-O-BSA 在相同激发条件下,荧光强度显著降低,说明 AFB₁-O 对 BSA 具有荧光淬灭作用,峰位置为 310,443,561,621,838 nm。与偶联前相比,产生了 443nm 荧光峰,推测是 AFB₁-O 的引入所产生的。从荧光淬灭机理分析,AFB₁-O 和 BSA 发生了偶联反应形成了复合物,属于静态淬灭。

1. BSA; 2. AFB₁-O-BSA 偶联物

(a) BSA 与 AFB₁-O-BSA 荧光发射光谱 C_{BSA}: 1.9 × 10⁻⁸ mol/L

1. 酪氨酸残基的同步荧光光谱; 2. 色氨酸残基的同步荧光光谱

(b) BSA 与 AFB₁-O-BSA 的同步荧光光谱 C_{BSA}: 1.9 × 10⁻⁸ mol/L

图7 AFB₁-O-BSA 与 BSA 的荧光光谱比较

Fig. 7 Fluorescence spectrum of AFB₁-O-BSA and BSA

(使激发波长和发射波长保持固定的波长间距(Δλ),同步扫描激发和发射单色器,可得到同步荧光光谱图,蛋白质的同步荧光光谱已被用来判断蛋白质的构象变化。由 Δλ = 15 nm 所得的同步荧光光谱图仅显示蛋白质酪氨酸残基的光谱特征;由 Δλ = 60 nm 所得到的同步荧光光谱图仅显示蛋白质色氨酸

残基的光谱特征。因残基的最大发射波长与其所处环境的极性有关,故由发射波长的改变可判断蛋白质的构象变化。图7(b)显示的是在相同条件下BSA和AFB₁-O-BSA的同步荧光光谱。与BSA相比,AFB₁-O-BSA偶联物的酪氨酸残基和色氨酸残基的最大发射波长均发生了明显的蓝移,荧光强度也显著降低。推测两者反应影响了BSA的酪氨酸残基和色氨酸残基,使得BSA疏水性增加,BSA内部的疏水结构增强,肽链伸展程度降低。荧光强度的降低也可能与附近别的残基上正电荷消失有关。色氨酸残基的最大发射波长从352 nm蓝移至340 nm,根据判别规则^[12],推测这是由于BSA更多的暴露于溶剂中造成的。

2.5 抗原的偶联比及免疫原性检测

蛋白载体BSA分子上AFB₁-O上偶联的数量对抗体的生成有较大的影响,过少或过多,都不能获得满意的抗体。AFB₁-O与BSA反应的起始摩尔比是影响偶联比的重要因素,起始摩尔比增加,偶联产物的摩尔比也会增加。本实验中AFB₁-O与载体蛋白BSA起始摩尔比为20:1,采用二甲基甲酰胺DMF和PBS(pH7.4)溶液混合溶剂系统,偶联比为9.34:1,利用率为46.7%,而用乙醇-水溶剂系统反应后的偶联比为4.35:1,利用率仅为21.75%。偶联比和利用率率的计算参考

文献[14]进行。作者用获得的抗原进行动物免疫,制备了AFB₁特异性兔抗血清,经间接非竞争ELISA测定,效价为25,600。与其结构类似物的交叉反应率为AFB₂ 28%,AFG₁ 27%,AFG₂ 11.1%。结果证实了所构建的完全抗原具有良好的免疫原性。

3 结 语

1) 通过衍生化反应,合成了AFB₁羧甲基活化物。利用碳二亚胺法合成AFB₁-O-BSA偶联物,构建AFB₁完全抗原并进行结构鉴定。起始摩尔比和合适的反应溶剂系统是提高偶连比和AFB₁-O利用率的主要因素。

2) 首次通过荧光光谱在分子水平上探讨AFB₁与BSA载体蛋白的偶联机制及偶联反应对BSA的构象影响。结果表明,AFB₁-O对BSA具有荧光淬灭作用,荧光淬灭模式为静态淬灭。荧光发射谱带发生改变,并且在443 nm产生了AFB₁-O的特征荧光峰。

3) 制备了AFB₁特异性兔抗血清,经间接非竞争ELISA测定,效价为25 600。与其结构类似物的交叉反应率为AFB₂ 28%,AFG₁ 27%,AFG₂ 11.1%。结果证实了所构建的完全抗原具有良好的免疫原性。

参考文献(References):

- [1] 王重庆. 分子免疫学基础[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999, 24-28.
- [2] 沈关心, 周如麟. 现代免疫学实验技术[M]. 武汉: 湖北科学技术出版社, 1998.
- [3] Apple R J, Domen P J, Muckerheide A, et al. Cationization of protein antigens. Increased antigen uptake by antigen-presenting cells[J]. *J Immunol*, 1988, 140: 3290-3295.
- [4] 朱立平, 陈雪清. 免疫学实验技术[M]. 北京: 军医出版社, 2000.
- [5] 江湖, 熊勇华, 许杨, 等. EDC法制备黄曲霉毒素人工抗原的研究[J]. 食品科学, 2005, 26(7): 125-128.
JIANG Hu, XIONG Yong-hua, XU Yang, et al. Preparation of aflatoxin B₁ artificial antigen by EDC method[J]. *Food Science*, 2005, 26(7): 125-128. (in Chinese)
- [6] Chu F S, Hsia S M T, Sun P S. Preparation and characterization of aflatoxin B₁-oxime[J]. *J AOAC*, 1977, 60, 791-794.
- [7] Gendloff E H, Casal W L, Ram H P, et al. Hapten-protein conjugate prepared by the mixed anhydride method[J]. *J Immunol Methods*, 1986, 92, 15.
- [8] 陈福生, 罗信昌, 周启, 等. 黄曲霉毒素 B₁的免疫检测 I 抗原的制备[J]. 菌物系统, 1999, 18(3): 316-320.
CHEN Fu-sheng, LUO Xin-chang, ZHOU Qi, et al. Immunological detection of aflatoxin B₁ I. preparation of aflatoxin B₁ antigen[J]. *Fungal Systematics*, 1999, 18(3): 316-320. (in Chinese)
- [9] Chu F S, Ueno I. Production of antibody against aflatoxin B₁[J]. *Applied and Environment Microbiology*, 1977, 23(6): 1125-1128.
- [10] 陈福生, 李根久. 黄曲霉毒素 B₁抗原的构建[J]. 卫生研究, 1998, 27(增): 133-138.
CHEN Fu-sheng, LI Gen-jiu. The construction of aflatoxin B₁ antigen[J]. *Journal of Hygiene Research*, 1998, 27 (supplement): 133-138. (in Chinese)
- [11] 蒋成, 陶义训. 酶联免疫测定法[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1984, 40.
- [12] 王敬政, 贺古香, 江崇球. 芦荟大黄素与血清白蛋白的相互作用[J]. 分析化学, 2001, 29(7): 782-784.
WANG Jing-zhen, HE Gu-xiang, JIANG Chong-qiu. The Interaction of Serum Albumin with Aloe-emodin[J]. *Chinese Journal of Analytical Chemistry*, 2001, 29(7): 782-784. (in Chinese)

(责任编辑: 朱明)