动物食品中去甲基睾酮的 纳米增强酶联免疫分析方法

刘春丽^{1,2}, 宋珊珊^{1,2}, 刘丽强^{1,2}, 张鹏^{1,2}, 彭池方^{*1,2}

(1. 食品科学与技术国家重点实验室, 江南大学, 江苏 无锡 214122; 2. 江南大学 食品学院, 江苏 无锡 214122)

摘要: 作者通过辣根过氧化物酶标记抗体(HRP-IgG)蛋白分子固定在金纳米粒子(GNP)表面的方法, 制备得到一种高活性的酶-金纳米复合物(HRP-IgG-GNP)。将该 HRP-IgG-GNP 应用于酶联免疫分析(ELISA)方法中, 针对去甲基睾酮(NT), 建立了一种高灵敏的纳米增强 ELISA 方法。该方法的检测灵敏度达到 0.01 ng/mL, 线性范围为 0.03~10 ng/mL。与传统 ELISA 方法相比, 该方法的灵敏度提高了 10 倍。该纳米增强 ELISA 方法有望开发高灵敏免疫分析方法中获得广泛应用。

关键词: 去甲基睾酮; 金纳米粒子; 纳米增强酶联免疫分析

中图分类号: TL 27115 文献标志码: A 文章编号: 1673—1689(2013)06—0656—05

A Nanoparticle-Enhanced ELISA Against Nortestosterone in Animal-Origin Food

LIU Chun-li^{1,2}, SONG Shan-shan^{1,2}, LIU Li-qiang^{1,2}, ZHANG Peng^{1,2}, PENG Chi-fang^{*1,2}

(1. State Key Laboratory of Food Science and Technology, Jiangnan University, Wuxi 214122, China; 2. School of Food Science and Technology, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract: Conjugating enzyme with nanoparticles is an effective approach to enhance the characteristics of enzyme molecule in biosensor. A highly active enzyme-nanoparticle complex, HRP-IgG GNP, was prepared by immobilizing horseradish peroxidase labeled antibody (HRP-IgG) onto the surface of gold nanoparticle (GNP). The HRP-IgG GNP complex was applied to the enzyme-linked absorbent immunoassay (ELISA) and a highly sensitive nanoparticle-enhanced ELISA method was developed against nortestosterone (NT). The sensitivity of the novel method reached 0.01 ng/mL and the linear range was 0.03~10 ng/mL. the nanoparticle-enhanced ELISA method was 10 times more sensitive than the traditional ELISA method. The above method has promising applications for developing highly sensitive immunoassay methods.

Keywords: nortestosterone, gold nanoparticle, nanoparticle-enhanced ELISA

收稿日期: 2012-05-30

基金项目: 教育部博士点新教师基金项目(20110093120003); 江南大学大学生实践创新项目。

* 通信作者: 彭池方(1975—), 男, 湖北荆州人, 工学博士, 副教授, 硕士研究生导师, 主要从事食品安全检测与控制方面的研究。

E-mail: pcf2125@yahoo.com.cn

去甲基睾酮(nortestosterone, NT),简称诺龙,是一种合成甾体激素,具有雄激素样作用的同化激素^[1]。临床主要用于治疗贫血、老年性骨质疏松、恶病质及男性避孕药的研究等。由于NT具有很强的促蛋白合成作用,也被非法用于运动员以提高运动成绩和动物饲料添加剂^[1-2]。去甲基睾酮作为动物饲料添加剂会在食用动物的肝、肾等组织中残留,过量摄入高残留的NT的动物组织后可产生激素样作用,如破坏人机体的激素平衡、干扰人的内分泌功能、影响生育能力、发育毒性(儿童早熟和女性男性化),可导致糖尿病,高剂量积累甚至可诱导心血管疾病^[3-4]。

已有许多用于NT检测的方法报道,包括气相色谱-质谱、液相色谱-质谱方法^[5-6]。色谱-质谱联用是一种非常灵敏和准确的激素药物检测方法,但是这些方法需要高技能的操作人员,离不开昂贵的大型设备和大型的实验室,而且其检测是一个冗长繁琐的过程。因此,这些弱点限制了这类方法的应用。免疫分析能够克服以上色谱-质谱方法的不足,如作者所在研究室开发的检测NT的酶联免疫分析(ELISA)^[7]、胶体金免疫层析检测^[8-9]方法,具有测试操作简单、仪器廉价、速度快、样品检测通量高等优点,因此可应用于大量生物样品的筛选检测。最近有报道NT的单克隆抗体筛选成功^[10],并建立NT的免疫检测方法,将有利于该技术和产品的稳定供应。进一步提高以上方法的灵敏度,可在实际样品前处理采用高稀释倍数,从而降低样品基质的干扰,提高检测结果的重复性和准确性。作者利用金纳米粒子的高比表面积,采用酶标抗体修饰的金纳米粒子作为ELISA中的探针,建立了一种新型的基于纳米增强的酶联免疫分析方法。与传统ELISA方法相比,该方法的检测灵敏度提高了10倍。因此,该方法在免疫分析中具有诱人的应用潜力。

1 材料与方法

1.1 试剂与仪器

1.1.1 试剂 氯金酸、柠檬酸钠、卵清蛋白(OVA):均购自Sigma公司;去甲基睾酮兔源抗体:作者所在实验室自制;辣根过氧化物酶标羊抗兔(HRP-IgG):购自吉泰生物公司;三丁胺、氯甲酸异丁脂、羧甲基羟胺半盐酸:购自TCI化学公司。其他有机溶剂和无机盐均为分析纯。

1.1.2 仪器 酶标仪:热电仪器;Biomate6微量分光光度计:热电科学;Nano ZS动态激光散射仪:DLS,马尔文;H-800透射电镜:TEM,日立公司。

1.2 人工抗原NT-OVA的制备

称取275 mg(约1 mmol)NT溶于10 mL无水吡啶,然后加入219 mg(约2 mmol)羧甲基羟胺半盐酸,50 °C搅拌反应30 min。减压蒸馏去吡啶。残余物用50~100 mL乙酸乙酯溶解,加适量水洗3~4次。取上层油样,加入少量无水硫酸钠干燥。减压蒸馏去乙酸乙酯,残余物用乙醚重结晶。

采用混合酸酐法与卵清蛋白(OVA)偶联。所得产物用双蒸水(2 L)透析2 d,每日更换缓冲液4次,最后两次用PBS透析,4 °C下保存备用。

1.3 金纳米粒子的制备

取100 mL质量浓度为0.1 g/dL的氯金酸溶液,放入经王水充分洗涤的烧瓶(250 mL)中,搅拌下用油浴加热至沸腾,加入2 mL柠檬酸钠溶液(质量分数1%),溶液变成酒红色后继续加热保持沸腾20 min。测试所得金纳米溶液光吸收曲线,计算其浓度为2 nmol/L^[11],同时透射电镜(TEM)观察其粒径和分散性。

1.4 酶标抗体-金纳米粒子偶联物的制备

配置质量浓度为0.2 mg/mL的酶标抗体(HRP-IgG)水溶液,取100 μL溶液,加入于1 mL胶体金溶液中,加入不同量的200 mmol/L的K₂CO₃溶液(0,1,2,3 μL),室温下避光振荡1 h(500 r/min),4 °C下静止24 h。观察溶液颜色变化,并测试其400~800 nm范围光吸收曲线,取颜色无变化、光吸收曲线没有扩展的溶液。最终选择酶标抗体-胶体金(HRP-IgG-GNP)的制备条件为:0.1 mg/mL酶标抗体,2 μL的K₂CO₃溶液。

1.5 纳米金-酶标二抗的光谱和粒径分析

用微量分光光度计测试400~800 nm波长范围GNP和HRP-IgG-GNP的吸收光谱。采用DLS测试3种样品的平均粒径,每种样品测试3次,取平均粒径测试结果的平均值为各样品的水合粒径。

1.6 纳米增强酶联免疫法建立

与传统酶联免疫法的操作步骤相同^[7]。首先采用NT-OV(100 μL/孔)包被微孔板,PBST洗液洗涤后,以0.5%的OVA封闭(200 μL/孔),洗液后得到敏化的微孔板,将其4 °C下干燥保存备用。向微孔中分别加入不同浓度的标准溶液(50 μL/孔)。以抗

体稀释液稀释抗体(50 $\mu\text{L}/\text{孔}$),振荡 1 min 后,37 $^{\circ}\text{C}$ 孵育 30 min。洗液充分洗涤后,加入抗体稀释液稀释一定倍数的 HRP-IgG-GNP 复合物(100 $\mu\text{L}/\text{孔}$),37 $^{\circ}\text{C}$ 下孵育 15 min。洗涤后加入 TMB 显色液(100 $\mu\text{L}/\text{孔}$),37 $^{\circ}\text{C}$ 反应 15 min,加入 2 mol/L 硫酸(100 $\mu\text{L}/\text{孔}$)终止反应。酶标仪中检测 450 nm 处的光吸收值。

1.7 样品前处理

取经过确证未受 NT 污染的牛肉样品,每份 2 g,剪碎,采用高浓度 NT 标准溶液添加,添加标准溶液后,静置 30 min,得到 NT 质量浓度分别为 1、5、20 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 的模拟样品。向上述样品中加入 4 mL 缓冲液 PBS(pH 8.0,0.01 mol/L)和 1 mL 甲醇,高速下匀浆 2 min,5 000 r/min 离心 10 min。吸取上清液,以 PBS (pH 8.0,0.01 mol/L) 缓冲液稀释 8 倍。在 ELISA 分析中,每个微孔加入 50 μL 的该样品溶液,所得结果对照校正曲线计算得到测试浓度。

2 结果与讨论

2.1 人工抗原 NT-OVA 分析

对 NT、OVA、NT-OVA 进行光谱扫描,结果见图 1。NT-BSA 的吸收光谱分别具有 NT 和 OVA 的吸收特征,并且由于在蛋白质结构上偶联了一定量的 NT 分子,导致了蛋白质特征峰的偏移,可以证明成功制备了人工抗原。

图 1 NT、OVA 和 NT-OVA 的紫外吸收光谱

Fig. 1 Absorption spectrum of NT, OVA and NT-OVA

2.2 HRP-SA-GNP 生物偶联物的表征

GNP 和纳米-酶复合物(HRP-IgG-GNP)的吸收光谱见图 2。由图 2 可知:GNP 的最大吸收峰为 518 nm,当前述条件下 GNP 表面吸附一定量的 HRP-IgG-GNP 后,最大吸收峰红移 11 nm,达到 529 nm。这与 GNP 随着粒径增大,其共振吸收峰红移的规律是一致的。

图 2 GNP 及 HRP-IgG-GNP 的吸收光谱

Fig. 2 Absorption spectrum of GNP and HRP-IgG-GNP

采用 DLS 分析 GNP 和 HRP-IgG-GNP 的粒径分布,比较 GNP 和 HRP-IgG-GNP 的水合分子半径,可以定性地观察 GNP 表面分子覆盖的程度,结果见图 3。计算 GNP 和 HRP-IgG-GNP 的粒径分布,平均水合粒径分别为 18 nm 和 33 nm。GNP 结合了 HRP-IgG-GNP 后,其粒径增加了 15 nm,与 HRP-IgG 的水合分子半径相近。这说明 HRP-IgG-GNP 与 GNP 的结合是比较紧密的,有利于其作为酶标记物的稳定使用。

图 3 GNP 和 HRP-IgG-GNP 的粒径分布

Fig. 3 Particle size distribution of GNP and HRP-IgG-GNP

采用透射电镜(TEM)分析纳米金及其结合酶标二抗复合物,结果见图 4,可见柠檬酸还原法制备的 GNP 粒径为 16 nm 左右,粒径均一,分散性好,GNP 表面结合 HRP-IgG 后,仍然保持均一的粒径和单分散性。

2.3 纳米增强 ELISA 分析 NT

采用传统 ELISA 方法的溶液体系,经方正法选择抗原、抗体和酶标记物的质量浓度,质量浓度分别为 4.0 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 的 NT-OVA、1.2 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 的 NT 抗体,金纳米-酶标记物(HRP-IgG-GNP)的稀释倍数为 100 倍。对不同质量浓度的 NT 标准溶液检测结果见图 5。其检测灵敏度为 0.01 ng/mL(定义抑制率

为 90% 处, 检测线性范围为 0.03 ~100 ng/mL ($R^2=99.3\%$), 而传统 ELISA 方法的检测灵敏度为 0.1ng/mL, 检测线性范围为 0.3 ~10 ng/mL ($R^2=99.7\%$), 两者相比, 基于纳米增强的 ELISA 方法的灵敏度提高了 10 倍。以上结果说明, 纳米金负载多个酶标二抗, 显示出一定的放大效应, 因此, 作为新型的酶标二抗试剂应用于 ELISA 方法中, 具有广泛的应用潜力。

图 4 TEM 图:GNP (a) 和 HRP-IgG-GNP (b)

Fig. 4 Transmission electron microscopy images of GNP (a) and HRP-IgG-GNP (b)

图 5 两种 ELISA 方法检测 NT 的校正曲线

Fig. 5 Calibration curve for the two ELISAs against NT

参考文献:

- [1] Delbeke F T, Desmet N, Debackere M. The abuse of doping agents in competing body builders in Flanders (1988-1993)[J]. *Int J Sports Med*, 1995, 16(1):66-70.
- [2] Sauer M J, Samuels T P, Howells L G, et al. Residues and metabolism of 19-nortestosterone laurate in steers [J]. *Analyst*, 1998, 123(12):2653-2660.
- [3] Brannvall K, Bogdanovic N, Korhonen L, et al. 19-Nortestosterone influences neural stem cell proliferation and neurogenesis in the rat brain[J]. *Eur J Neurosci*, 2005, 21(4):871-878.
- [4] Bahrke M S, Yesalis C E. Abuse of anabolic androgenic steroids and related substances in sport and exercise [J]. *Curr Opin Pharmacol*, 2004, 4(6):614-620.
- [5] Yamada M, Aramaki S, Kurosawa M, et al. Simultaneous doping analysis of main urinary metabolites of anabolic steroids in horse by ion-trap gas chromatography-tandem mass spectrometry[J]. *Anal Sci*, 2008, 24(9):1199-1204.
- [6] Grace P B, Drake E C, Teale P, et al. Quantification of 19-nortestosterone sulphate and boldenone sulphate in urine from male horses using liquid chromatography/tandem mass spectrometry[J]. *Rapid Commun Mass Spectrom*, 2008, 22(19):2999-3007.

2.4 分析应用

在样品处理中采用了高稀释倍数的方法, 对降低样品基质的干扰具有明显作用^[11-12]。对残留范围 1.0~20 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 的牛肉样品, 检测回收率可达到 87.8~96.2%, 相对偏差小于 9%。相比传统 ELISA 方法, 检测结果的更准确、重复性更高^[7,11]。

表 1 牛肉样品添加回收率的测定 ($n=5$)

Table 1 Recovery of NT in beef detected by the nanoparticle-enhanced ELISA

添加质量分数/ ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	检测质量分数/ ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	回收率/%	相对偏差/%
1.0	0.878 ± 0.076	87.8	8.7
5.0	4.81 ± 0.34	96.2	7.0
20	18.86 ± 1.55	94.3	8.2

3 结语

通过简单的方法在纳米金表面负载 ELISA 检测中常用的酶标二抗分子, 可得到更高活性的酶标二抗-纳米金复合物。该复合物具有单分散性和高催化活性等优点, 将其应用于激素 NT 的 ELISA 检测中, 可将传统 ELISA 方法的灵敏度提高 10 倍, 同时改善检测的准确性和重复性。该方法有望在 ELISA 和其它免疫分析方法中获得广泛应用。

- [7] Xu C L, Peng C F, Hao K, et al. Determination of 19-nortestosterone residue in aquaculture tissues by enzyme-linked immunosorbent assay and comparison with liquid chromatography and tandem mass spectrometry [J]. *Intern J Environ Anal Chem*, 2006, 86(11): 819-832.
- [8] Liu L Q, Peng C F, Jin Z, et al. Development and evaluation of a rapid lateral flow immunochromatographic strip assay for screening 19-nortestosterone[J]. *Biomed. Chromatogr*, 2007, 21(8): 861-866.
- [9] Tian Z, Liu L Q, Peng C F, et al. A new development of measurement of 19-nortestosterone by combining immunochromatographic strip assay and image software[J]. *Food Agric Immunol*, 2009, 20(1): 1-10.
- [10] Jiang J Q, Wang Z L, Zhang H T, et al. Monoclonal antibody-based ELISA and colloidal gold immunoassay for detecting 19-nortestosterone residue in animal tissues[J]. *Agric Food Chem*, 2011, 59(18): 9763-9769.
- [11] Peng C F, Chen Y W, Wei C N, et al. Development of a sensitive heterologous ELISA method for analysis of acetylgestagen residues in animal fat[J]. *Food Chemistry*, 2008, 109(3): 1647-653.
- [12] 彭池方, 沈崇钰, 安可婧, 等. 高效液相色谱-串联质谱联用测定脂肪中乙酰孕激素残留[J]. *分析化学*, 2008, 36(8): 1117-1120.
PENG Chi-fang, SHEN Cong-yu, AN Ke-jing. Analysis of acetylgestagens residues in animal fat by liquid chromatography tandem mass spectrometry[J]. *Analytical Chemistry*, 2008, 36(8): 1117-1120. (in Chinese)
- [13] 王黎丽, 陈芳芳, 吴超, 等. 基于单克隆抗体的三聚氰胺 ELISA 检测方法的建立[J]. *食品生物技术学报*, 2011, 31(6): 962-967.
WANG Li-li, CHEN Fang-fang, WU Chao, et al. Establishment of ELISA methods for detecting melamine based on monoclonal antibodies[J]. *Journal of Food Science and Biotechnology*, 2011, 31(6): 962-967. (in Chinese)

科 技 信 息

加拿大公布乳制品、豆制品中三聚氰胺含量的调查结果

4月18日,加拿大食品检验署(CFIA)公布了2010-2011年度乳制品、豆制品中三聚氰胺含量的调查结果。结果发现,所有的受检产品均安全,不会对消费者的健康构成威胁。

本次调查共抽取了来自11个城市的加拿大国产及进口产品中的590件样品,其中乳制品302件,豆制品288件。除了婴儿配方/谷物(粉),测试样品包括冷藏饮料牛奶、糖果、奶酪、牛奶、浓缩乳霜(冷藏随时可使用)、牛奶、即时混合饮料、酸奶和调味料。测试的大豆制品包括冷藏和非冷藏大豆饮料/饮料、奶酪、面霜、豆奶、大豆、豆腐等。检测结果表明,所有牛奶、大豆产品中的三聚氰胺含量均低于加拿大三聚氰胺临时标准(2.5ppm)。所有的婴儿配方奶粉及米粉中均未检出三聚氰胺。

三聚氰胺是一种在商业与工业领域内应用的人工合成产品,并不会天然存在于环境与食品中,也禁止添加于食品中。然而由于化肥以及杀虫剂的使用,食品中可能会出现微量的三聚氰胺残留。

[信息来源]Canadian Food Inspection Agency. All Milk-Based and Soy-Based Product Samples Tested for Melamine Safe for Human Consumption [EB/OL]. (2013-4-18). <http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/newsroom/news-releases/2013-04-18/eng/1365615404545/1365615413753>.

欧盟拟取消1,3-二氯丙烯的最大残留限量

5月3日,欧盟食品安全局就审查1,3-二氯丙烯(1,3-dichloropropene)的最大残留限量发布了意见,建议取消其残留限量规定。

欧盟食品安全局认为,由于欧盟已停用1,3-二氯丙烯,国际食品法典委员会也未制定1,3-二氯丙烯的最大残留限量,而且EFSA也未收到进口限量通报,因此建议取消1,3-二氯丙烯在动植物商品中的残留限量规定。

[信息来源]EFSA. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dichlobenil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. *EFSA Journal* 2013;11(5):3218.